

		PRE-REQUIS AU TEST DE DEGLUTITION APRES EXTUBATION	
Patient réa : Atteintes tronc cérébral, nerf crânien avec problème déglutition	Bilan par kiné	Extubé depuis	Entre 24 et 48 h
		GCS / éveil	Reste éveillé au moins 15 minutes d'affilée
		RESPIRATION /TIRAGE	FR <25 c/min Pas de tirage Pas de balancement thoraco-abdo
Patient réa : pas de problème particulier (déglutition, salive, encombrement)	Test par IDE / AS Si survenue problème déglutition alimentaire : bilan kiné	TOUX	Spontanée efficace Et /ou Réflexe efficace Et / ou à la demande efficace
		ENCOMBREMENT	Peu important Absent
Patient post-op	Test par IDE / AS Si survenue problème déglutition alimentaire : bilan kiné	DEGLUTITION	Réflexe visible, observé Pas de bruits OrL, râles, ronflements Pas de raclement de gorge
		SALIVE	Pas de stase salivaire importante

TEST DEGLUTITON	
Patient à distance (>2h) des gavages, et Installé (cf consignes) Vérifier et Dégager arrière-gorge (kiné respi avant test si besoin) Espacer de quelques secondes chaque cuillerée Vérifier après les 4 essais si pas de stases buccales.	Signes échecs : <ul style="list-style-type: none"> ➤ Toux (jusqu'à 2 minutes après déglutition) ➤ Garde aliment en bouche ➤ Désaturation (fausse route silencieuse) ➤ Pic fébrile 4 heures après (fausse-route silencieuse)

INSTALLATION DU PATIENT, CONSIGNES, INFORMATIONS :

.....

.....

