



Noyades : prise en charge actuelle et perspectives P Michelet – Urgences Timone 2

REVIEW ARTICLE

CURRENT CONCEPTS

Drowning

David Szpilman, M.D., Joost J.L.M. Bierens, M.D., Ph.D.,
Anthony J. Handley, M.D., and James P. Orłowski, M.D.

Une Revue récente

Constatations plus alarmantes encore !

500 000 décès (meilleur recensement)
Statistiques actuelles n'incluant pas les catastrophes naturelles et les naufrages !
Plus de 200 M de \$ aux USA, 250 M de \$ au Brésil
Épidémiologie différente entre les pays « riches » et les autres

Différences épidémiologiques

- Pays défavorisés
 - Les enfants
 - La pauvreté
 - Le sexe masculin
 - Le défaut de scolarisation
 - La ruralité
 - L'alcool
- Pays riches
 - De - en - les enfants
 - L'Homme > 55 ans
 - Pathologies associées
 - Les conduites à risque
 - L'alcool
 - La ruralité



Drowning, Current Concepts, Szpilman D et al. N Engl J Med 2012; 366:2012-10

La situation française



- Une évaluation épidémiologique bien menée par l'INVS
 - Évaluations en 2015, 2012, 2009, 2006, 2003, 2004
- Un **nombre de noyade stable**
 - 1226 noyades accidentelles en 2015
 - 1366 en 2009; 1207 en 2006
- Un **taux de mortalité qui ne diminue pas**
 - 436 décès (soit 34%) en 2015
 - 34% en 2009 contre 33% en 2006
- Mais aucune donnée médicale précise

La situation française



Source : INVS 2009, 2015

De la définition à la physiopathologie

Définition – vers la simplification

• La noyade:


Etat résultant d'une insuffisance respiratoire provoquée par la submersion ou l'immersion en milieu liquide

• Défaillance respiratoire aiguë

- Élément physiopathologique majeur responsable d'une hypoxémie
- Défaillances viscérales secondaires à l'hypoxémie
 - Arrêt cardiaque
 - Coma et encéphalopathie post-anoxique
 - Défaillance rénale
 - Défaillance hématologique (CIVD)

Van Beeck et al. Bull World Health Organ 2005; 83: 853-6

Algorithme de Szpilman



Physiopathologie – encore méconnue

- Insuffisance respiratoire aiguë : OK
 - Ingestion >> Inhalation
- Insuffisance cardio circulatoire
 - Finalité = Arrêt Cardiaque Hypoxique
 - Mais avant ??
 - Tachycardie : OK
 - Décharge catécholaminergique ??

Résolutivité rapide de l'IRA ↔ OAP ??

Physiopathologie – encore méconnue

- Insuffisance cardio circulatoire
 - Finalité = Arrêt Cardiaque Hypoxique
 - Mais avant ??
 - Tachycardie : OK
 - Décharge catécholaminergique ??
- Évaluation échographique (n=17)
 - Pas de dysfonction gauche systolique ou diastolique
 - Plutôt dysfonction droite
 - A suivre ...

Physiopathologie – encore méconnue

- Insuffisance respiratoire aiguë : OK
 - Ingestion >> Inhalation
- Insuffisance cardio circulatoire
 - Finalité = Arrêt Cardiaque Hypoxique
 - Mais avant ??
 - Tachycardie : OK
 - Décharge catécholaminergique ??
- Participation métabolique ?

Drowning, haemodilution, haemolysis and staining of the intima of the aortic root – preliminary observations
Roger W. Byard^{1,2,3*}, Glenda Cairns⁴, Ellie Simpson⁵, David Eitner⁶, Michael Tuckers⁷

CLINICAL
FORENSIC
MEDICINE

• Etude observationnelle

- 74 victimes :
 - 44 en eau douce (age = 43,4 ans)
 - 30 en eau de mer (age = 60.5 ans)
 - Mesure du Na dans le ventricule gauche (post mortem)

• Résultats (p=0,001)

- Eau douce : 117 ± 14.2 mmol/l
- Eau de mer : 153 ± 14.4 mmol/l

	Na	K	pH
Eau de mer	145 ± 5	4 ± 0.6	7,23 ± 0,13
Eau douce	132 ± 4	4,3 ± 0,6	7,13 ± 0,19

NS

Drowning

David Szpilman, M.D., Joost J.L.M. Bieren, M.D., Ph.D., Anthony J. Handley, M.D., and James P. Orlowski, M.D.

Plus d'allusion précise

N Engl J Med 2012;366:2102-10.

Drowning in fresh and saltwater has the same respiratory and metabolic course in a matched cohort study

Pierre MICHELET¹, Marion DUSART¹, Laurence BORON², Julien MARMIN³, Tarek MOKNI⁴, Anderson LOUNDOU², Mathieu COULANGE⁵, Tibbaz MARKARIAN¹.

Eur J Emerg Med 2018

	Fresh Water Group	Sea Water Group	P
Respiratory parameters			
PEEP (cmH ₂ O) *	7 ± 4	5 ± 4	0.31
Respiratory pressure (cmH ₂ O) †	12 ± 4	10 ± 4	0.46
pH (n)	7.18 ± 0.24	7.25 ± 0.14	0.630
PaO ₂ (n)	141 ± 76	220 ± 122	0.023
PaCO ₂ (n)	229 ± 105	202 ± 73	0.386
pCO ₂ (n) (mmHg)	48 ± 13	47 ± 11	0.932
pCO ₂ (n) (mmHg)	38 ± 8	43 ± 6	0.069
NIY length of stay (day)	1.4 ± 2	1.2 ± 7	0.638
NIY length of stay (day)	7 ± 17	9 ± 15	0.394
Metabolic parameters			
Sodium (n) (mmol/L)	140 ± 5.2	144 ± 6.8	0.004
Potassium (n) (mmol/L)	4.12 ± 0.8	4.32 ± 0.9	0.323
Lactate (n) (mmol/L)	4.2 [1.5-14.4]	2.5 [1.4-3.5]	0.127
Potential (n) (g/L)	63 ± 13	70 ± 9	0.026

Conclusions: Despite initial differences in respiratory function, the type of water did not influence the clinical outcomes for patients admitted to ICU after drowning

Drowning Classification: a reappraisal of clinical presentation and prognosis for most severe cases.

Michelet et al. En cours de rédaction

	N	%
GCS ≤ 8	151	49,8
9 ≤ GCS ≤ 12	21	6,9
GCS ≥ 13	131	43,2

Il existe une répartition des noyés en deux grands groupes en fonction de l'état neurologique

Ceci aura des conséquences majeures en terme de prise en charge.

Pronostic de l'AC sur Noyade

Pronostic des patients

Fonction de la durée d'immersion

Quan L et al. Predicting outcome of drowning at the scene: A systematic review and meta-analyses. Resuscitation 2016;104:63-75

Fonction de la rapidité d'intervention des secours

Jeong J et al. Relationship between drowning location and outcome after drowning-associated out-of-hospital cardiac arrest:nationwide study. Am J Emerg Med. 2016;34(9):1799-803

Fonction du stade de gravité lors de la prise en charge

Prognostic factors and outcome after drowning in an adult population

M. A. BALLESTEROS, et al. Acta Anaesthesiol Scand 2009; 53: 931-940

Results: There were 43 patients (five children and 38 adults), with male predominance. Fifteen patients, all adults (34.9%), died

Table 1
Univariate analysis of the main variables.


	N	β	SE	OR (95% CI)	P
Gender					
Age (years)	43	0.041	0.307	1.04 (1.01-1.08)	0.018
Submersion time (minutes)	30	0.300	0.138	1.42 (1.09-1.96)	0.011
Water temperature (°C)	52	0.053	0.053	0.61 (0.37-0.99)	0.040
Apnoea (minutes)	36	0.004	0.006	1.01 (0.98-1.03)	0.001
GCS (points)	42	0.113	0.013	0.64 (0.51-0.80)	<0.001
No pupillary reactivity	41	3.275	0.940	26.25 (4.50-167.75)	<0.001
APACHE II score (points)	34	0.286	0.081	1.34 (1.13-1.61)	0.001

CI is confidence interval; β is each increase or decrease in the unit of measurement in which the variable is expressed; APACHE II, acute physiology and chronic health evaluation; GCS, Glasgow Coma Score; β, logistic regression coefficient; SE, standard error; OR, odds ratio.

Laveille JM et al. CCM 1993

Algorithme de Szpilman

Szpilman D, et al Chest 1997; 112: 660-665




En sommes nous toujours là ??

Drowning Classification: a reappraisal of clinical presentation and prognosis for most severe cases.

Michelet et al. En cours de rédaction

Population	308, n (%)	Age, years	Sex ratio (F/M)	Mortality, n (%)
Grade 2	20	52+/-18	8/12	0
Grade 3	134	57+/-20	55/79	3 (2.2)
Grade 4	7	49+/-24	5/3	0
Grade 5	49	52+/-22	16/33	1 (2)
Grade 6	98	53+/-19	29/70	53 (54.1)

Algorithme de Szpilman



Drowning Classification: a reappraisal of clinical presentation and prognosis for most severe cases.

Michelet et al. En cours de rédaction

Population	308, n (%)	Age, years	Sex ratio (F/M)	Mortality, n (%)
Grade 2	20	52+/-18	8/12	0
Grade 3	134	57+/-20	55/79	3 (2.2)
Grade 4	7	49+/-24	5/3	0
Grade 5	49	52+/-22	16/33	1 (2)
Grade 6	98	53+/-19	29/70	53 (54.1)

Nous avons énormément de détresses respiratoires isolées

Nous n'avons que très peu de détresses hémodynamiques associées

Can we identify termination of resuscitation criteria in cardiac arrest due to drowning: results from the French national out-of-hospital cardiac arrest registry
Hubert H, Escutnaire J, Michelet P, et al
Journal of Evaluation in Clinical Practice. 2016 17(8):712-20



Registre RéAC.


Amélioration de la survie si :

- Rapidité d'intervention des secours OR: 0.960[0.925; 0.996]
- Réduction de la période de no flow OR: 0.535[0.313; 0.913]
- Association avec la ventilation OR: 6.742[2.043; 22.250]

AC et Noyade :
Toujours MCE « ET » VA

Prise en Charge Thérapeutique

Creating a drowning chain of survival David
Szpilman., Jonathon Webber., Linda Quan., Joost Bieren., Luiz Morizot-Lette.,
Stephen John Langendorfer., Steve Beerman., Bo Løftgren.



Resuscitation 85 (2014) 1149–1152

Association of water temperature and submersion duration and drowning outcome

Linda Quan, Christopher D. Mack, Melissa A. Schiff.



Resuscitation 85 (2014) 700–704


Multivariate predictors for good outcome in open water drowning victims.

Characteristics	Adjusted RR (95% CI)
Age (years)	
0–4	1.34 (1.01, 1.79)
5–14	1.33 (0.96, 1.85)
15+	1.0
Submersion duration (minutes)	
<5	1.0
6–10	0.39 (0.23, 0.65)
11+	0.02 (0.01, 0.04)
Water temperature (°C)	
<6	1.0
6–16	1.13 (0.84, 1.52)
17+	0.97 (0.71, 1.33)

"estimated submersion duration was the most powerful predictor of outcome. Recommendations for initiation of rescue and resuscitation efforts should be revised to reflect the very low likelihood of good outcome following submersion greater than 10 min."

Unmanned aerial vehicles (drones) in out of-hospital-cardiac-arrest

A. Claesson, D. Fredman, L. Svensson, M. Ringh, J. Hollenberg, P. Nordberg, M. Rosenqvist, T. Djarv, S. Osterberg, J. Lennarsson and Y. Ban.



Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine (2016) 24:124

"To use drones in rural areas to deliver an AED in OHCA may be safe and feasible. Suitable placement of drone systems can be designed by using Geographic Information System models. The use of an AED equipped drone may have the potential to reduce time to defibrillation in OHCA."

Drones may be used to save lives in out of hospital cardiac arrest due to drowning

A. Claesson, L. Svensson, P. Nordberg, M. Ringh, M. Rosenqvist, T. Djarv, J. Samuelsson, O. Hernborg, P. Dahlbom, A. Jansson, J. Hollenberg.

Method:

Randomized simulation study used a submerged manikin placed in a shallow (<2 m) 100 × 100-m area at Työlösand beach, Sweden.

A search party of 14 surf-lifeguards (control) was compared to a drone transmitting video to a tablet (intervention). Time from start to contact with the manikin was the primary endpoint.

Results:

- Twenty searches were performed in total, 10 for each group.
- The median time from start to contact with the manikin was 4:34 min (IQR 2:56–7:48) for the search party (control) and 0:47 min (IQR 0:38–0:58) for the drone-system (intervention) respectively ($p < 0.001$).
- The median time saved by using the drone was 3:38 min (IQR 2:02–6:38).



Chaine de survie de la noyade



Beaucoup d'éléments en rapport avec le secourisme

Sjöblom O, Wollmer L, Quan L, et al. Creating a drowning chain of survival Resuscitation 2014;85:1149–52:536

Unmanned aerial vehicles (drones) to prevent drowning

Celia Seguin¹, Gilles Blaquière², Anderson Loundou³, Pierre Michèle³, Thibaut Markarian³



Resuscitation 127 (2016) 63–67

	Calm conditions N rescues = 8	Moderate conditions N rescues = 13	Rough conditions N rescues = 7
UAV Time	64 ± 25	68 ± 41	84 ± 34
Life Buoy grab	10:54	13 ± 5	15 ± 8
SRO Time	93±47 *	179 ± 78 *	198 ± 130 *
Jet-Ski Time	105±25 \$	178 ± 25 \$	142 ± 39 \$




SAMU 40



Unmanned aerial vehicles (drones) to prevent drowning

Celia Seguin¹, Gilles Blaquière², Anderson Loundou³, Pierre Michèle³, Thibaut Markarian³



Secourisme et RCP de base

- Extraction de la victime
 - Insufflation si possible
- Sur la rive
 - ABC et non CAB = lutte contre l'hypoxémie ++
 - Jamais de tentative d'aspiration trachéale ou bronchique
 - MCE, Intubation dès que possible
 - Régurgitations très fréquentes
 - 65 % si ventilation seule
 - 86 % si RCP complète

Manolios N, Mackle I. Drowning and near-drowning on Australian beaches patrolled by life savers: a 10-year study, 1973-1983. Med J Aust 1988;148:165-7, 170-1.

Secourisme et RCP de base

- Extraction de la victime
 - Insufflation si possible
- Sur la rive
 - ABC et non CAB = lutte contre l'hypoxémie ++
 - Jamais de tentative d'aspiration trachéale ou bronchique
 - MCE, Intubation dès que possible
 - Régurgitations très fréquentes
 - 65 % si ventilation seule
 - 86 % si RCP complète
- Défibrillation
 - Très fréquente asystolie
 - Si T° < 30°C pas plus de trois chocs

Drowning Classification: a reappraisal of clinical presentation and prognosis for most severe cases.

Michelet et al. En cours de rédaction

	N	%
GCS ≤ 8	151	49,8
9 ≤ GCS ≤ 12	21	6,9
GCS ≥ 13	131	43,2

Il existe une répartition des noyés en deux grands groupes en fonction de l'état neurologique


Ceci aura des conséquences majeures en terme de prise en charge.

Tous les GCS ≤ 8 = Ventilation au masque et intubation oro trachéale

Tous les GCS ≥ 13 = Oxygénation +++ et potentielle techniques non invasives

Drowning

David Szpilman, M.D., Joost J.L.M. Bierens, M.D., Ph.D., Anthony J. Handley, M.D., and James P. Orlowski, M.D. N Engl J Med 2012;366:2102-10.




	ACR	Pas d'ACR	P
pH initial	7.11	7.27	<0.001
PuCO2 initiale (mmol/L)	49	46	NS
PuO2/FiO2	217	155	0.052
Température corporelle initiale (°C)	34.6	36.6	<0.001
PAM HO (mmHg)	84	90	NS
Fréquence cardiaque HO (/min)	91	93	NS
Remplissage vasculaire 24h (litre)	2.5	0.7	<0.001
Jours avec amines	3	0.3	<0.001
Défaillance cardiaque	40 %	3 %	<0.001
Glycémie (mmol/L)	14.3	8	<0.001
Lactatémie (mmol/L)	8.6	3.5	<0.001
Protidémie (g/L)	64	71	<0.05
Diurèse (mL)	2030	1550	<0.05
SAPS2	65	33	<0.05
SOFA	11	4	<0.05
Durée de séjour en réanimation (jour)	12	3	<0.05
Mortalité à 28 jours	60 %	0 %	<0.05

Principaux paramètres comparatifs entre le groupe ACR et le groupe n'ayant pas présenté d'ACR (moyenne)

Drowning

David Szpilman, M.D., Joost J.L.M. Bierens, M.D., Ph.D., Anthony J. Handley, M.D., and James P. Orlowski, M.D. N Engl J Med 2012;366:2102-10.



Acute respiratory failure after drowning: a retrospective multicenter survey

Pierre Michelet¹, Foad Bouzani², Olivia Charnassat³, Fabrice Tiger⁴, Jacques Durand-Gasselin⁵, Sami Hraiech⁶, Sami Jaber⁷, Jean Dellamonica⁸ and Carole Ichi⁹

European Journal of Emergency Medicine 2015




Table 1 Unlabeled style for drowning parameters

	Oxygen group (N=14)	MV group (N=44)	MV group (N=30)
Age (years)	56±21	65±14	58±23
Sex (male/female)	9/5	20/21	12/18
Cardiovascular disease (n)	2 (14)	20 (45)	9 (30)
Respiratory disease (n)	1 (7)	3 (6.5)	5 (18)
Neurological disease (n)	1 (7)	6 (14)	8 (27)
Loss of consciousness (n)	2 (15)	18 (40)	21 (70)
Glasgow Coma Scale (n)	13+9*	14+1*	7+2
Core temperature (°C)	36.2±1.1	36.7±1.4	36.2±1.2
Mean arterial pressure (mmHg)	90±22	96±18	77±18
Heart rate (b/min)	91±25	92±24	87±26
pH (mmHg)	7.33±0.06	7.31±0.08	7.33±0.09
PaO ₂ (mmHg)	243±154*	156±92	149±95
PaCO ₂ (mmHg)	43±8	44±8	52±11
HCO ₃ ⁻ (mmol/L)	22±2	22±3	22±4
Lactate (mmol/L)	2.0±0.6	2.6±1.8	3.4±2.3
SAPS 2 score	24±8	28±8	50±19
SOFA score	1.7±1	2.4±2	8.1±4
Incidence of infection	0	1 (2)	8 (26)

*Data recorded at the ICU admission.
*For PaO₂/FiO₂ ratio calculation, the measured PaO₂ on blood gas analysis was divided by 80% FiO₂ as oxygen concentration in the heavy oxygen supply mask.

Acute respiratory failure after drowning: a retrospective multicenter survey
Pierre Michelet¹, Foad Bouzani², Olivia Charnassat³, Fabrice Tiger⁴, Jacques Durand-Gasselin⁵, Sami Hraiech⁶, Sami Jaber⁷, Jean Dellamonica⁸ and Carole Ichi⁹

VNI possible et safe
Patients en amélioration
neurologique OK

Perspectives

- Physiopathologie
 - Place du cœur dans la physiopathologie ?
 - Sidération myocardique ?
 - Incompétence VD ?
- Thérapeutique
 - Projet de PHRC National sur CPAP et DRA post Noyade
- Prévention
 - Amélioration de la rapidité de mise à disposition de moyens de flottabilité

Merci de votre écoute