C·H·U
Hôpitaux de Bordeaux

Ischémie Mésentérique Aiguë

JARCA 2015

Dr Fleureau

CHU Bordeaux-Hôpital Sud

SAR 2 Secteur digestif

Rappels anatomiques

Physiologie

Ackland, G., M. P. Grocott, et al. (2000). "Understanding gastrointestinal perfusion in critical care: so near, and yet so far." *Crit Care*

Physiologie

Ischemie Reperfusion

1er Coup

2è Coup

Ackland, G., M. P. Grocott, et al. (2000). "Understanding gastrointestinal perfusion in critical care: so near, and yet so far." *Crit Care*

Réaction inflammatoire intestinale et systémique

THE NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE

REVIEW ARTICLE

MEDICAL PROGRESS

The Pathophysiology and Treatment of Sepsis

Richard S. Hotchkiss, M.D., and Irene E. Karl, Ph.D.

Physiopathologie IMA

Lésions muqueuses 10-30'

Hypermotricité
intestinale

Douleurs

Sous-muqueuse, transmurale

Disparition de
l'activité motrice

Distension
abdominale

Inflammation systémique
Viscérale

Perméabilité de
la barrière intestinale

Translocation
Hémorragie

Perforation
Nécrose

Inflammation viscérale
et systémique

Etat de choc
péritonite

Nécrose noire

Défaillance
multiviscérale

Etiologies des IMA

Aiguë ou chronique

Selon le segment intestinal

Selon les vaisseaux atteints

Selon le mécanisme

Ischémie occlusive

Ischémie non occlusive

Embolique

Thrombotique

Corcos O. Acute Mesenteric ischemia Colon Rectum (2010) 4:4-13 Springerlink

IMA occlusives 50%

- Occlusion embolique ou thrombotique artérielle
    - Thrombus sur hypokinésie
    - ACFA
    - Valvulopathie emboligène
    - Maladie athéromateuse
    - Occlusion aiguë sur IM chronique
    - Vascularite
    - Anevrysme aortique disséquant
    - Dysplasie fibro-musculaire
    - Ligature chirurgicale
-

IMA veineuses

- Thrombose V mésentérique primitive
    - Deficit proteine C prot S AT3 facteur V Leiden
    - Syndrome Ac ant-phospholipides
  - Thrombose veineuse secondaire
    - Pancréatite
    - Cirrhose et HTP
    - Budd Chiari
    - Contraception orale
-

IMA non occlusives 20 à 30%

- Défaillance cardiaque
  - Collapsus prolongé
  - Etat de choc (choc septique+++)
  - Vasoconstriction mésentérique toxique
    - Cocaïne
    - Noradrénaline
    - Glypressine
    - Dérivés de l'ergot
-

IMA extra-vasculaires

- Causes « mécaniques »
    - Hernie étranglée
    - Adhérences
    - Mésentérite rétractile
    - Tumeurs endocrines
    - Syndrome du ligament arqué du diaphragme
-

Pronostic de l'IMA

Study (yr)	No. of patients	Mortality (%)		Mortality (%)	
		No gangrene	Gangrene	Sxs < 24 h	Sxs > 24 h
Batellier and Kieny(1990)	65	25	68	—	—
Boley et al.(1981)	47	—	—	57	73
Inderbitzi et al.(1990)	83	—	—	0a	88
Kieny (1990)	98	26	71	—	—
Lazaro et al. (1986)	23	25	75	—	—
Levy et al.(1990)	92	31	73	—	—
Ritz et al.(1997)	141	—	—	44b	92
Vellar and Doyle (1977)	52	—	—	54	95

a<12 hours, mortality = 17%. b<12 hours, mortality = 0%.

Systematic review of survival after acute mesenteric ischaemia

I. G. Schoots^{1,2}, G. I. Koffeman¹, D. A. Legemate¹, M. Levi² and T. M. van Gulik¹

Diagnostic clinique

- Signes peu spécifiques
    - Douleur abdominale intense
    - Défense, contracture
    - Syndrome occlusif
    - Diarrhée hémorragique
    - Sepsis
-

Surgical management of peritonitis secondary to acute superior mesenteric artery occlusion

World J Gastroenterol 2014 August 7; 20(29): 9936-9941
ISSN 1007-9327 (print) ISSN 2219-2840 (online)

Stefan Acosta

Table 1 Frequency of acute mesenteric ischemia in patients with acute abdomen *n* (%)

Patient selection criteria	Population	Study period	Frequency of acute mesenteric ischemia	Ref.
Emergency laparotomy	Atlanta, United States	1996-2001	53 (17.7)	[5]
Suspected peritonitis	Ferrara, Italy	1995-2001	2 (2.1)	[6]
Emergency abdominal surgery and age $\geq$ 70 yr	Valladolid, Spain	1986-1995	27 (3.8)	[7]
Forensic autopsy, peritonitis	Malmö, Sweden	1970-1982	6 (4.4)	[8-10]
Acute abdomen and age $\geq$ 50 yr	Karlskrona, Sweden	2000-2003	9 (8.9)	[11]
Long-term open abdomen treatment	Malmö, Uppsala, Falun, Gävle	2006-2009	11 (9.9)	[12]
Emergency laparotomy	Eastborne, United Kingdom	2008-2010	3 (3.1)	[13]
Emergency laparotomy and age $\geq$ 80 yr	Gillingham, United Kingdom	2005-2010	5 (5.0)	[14]
Damage-control laparotomy and non-trauma patients	Auckland, New Zealand	2008-2010	13 (31.0)	[15]

Modern treatment of acute mesenteric ischaemia

S. Acosta¹ and M. Björck²

¹Vascular Centre, Skåne University Hospital, Malmö, and ²Vascular Surgery, Department of Surgical Sciences, Uppsala University, Uppsala, Sweden
Correspondence to: Dr S. Acosta, Vascular Centre, Skåne University Hospital, S205 02 Malmö, Sweden (e-mail: stefan.acosta@telia.com)

Table 1 Clinical presentation at admission to hospital in patients with acute mesenteric ischaemia

	SMA embolus	SMA thrombus	Venous thrombus
History			
Age ≥ 80 years	++	+	-
Age < 50 years	-	-	+
Women > men	+	+	+/-
Atrial fibrillation	++	-	-
Previous myocardial infarction	++	+	-
Stroke	+	++	-
Previous arterial embolism/source of embolus	++	-	-
Previous symptoms of chronic mesenteric ischaemia	-	++	-
Previous deep venous thrombosis or pulmonary embolism	-	-	++
Activated protein C resistance	-	-	++
Pancreatitis or pancreatic cancer	-	-	++
Liver cirrhosis/portal hypertension	-	-	++
Symptoms			
Sudden onset	++	+/-	-
Insidious onset	-	+	+
Abdominal pain	++	+	+
Vomiting	++	++	+
Diarrhoea	+	+	+
Bloody stools	+	+	+/-
Synchronous embolism	++	-	-

++, Factor likely to be present; +, factor perhaps present; -, factor unlikely to be present.

Diagnostic biologique

Hyperleucocytose

Hyperamylasémie

Acidose lactique

Hémoconcentration

Troubles de l'hémostase

CPK BB

DDimères

hyposcholéstérolémie

procalcitonine

D-Lactates

VPP 70% - VPN 89%

Hyperphosphorémie

IMAID
albumine modifié par
l'ischémie

IABP
fatty acid binding
protein

Endotheline 1

NO

Endotheline 1

Alpha glutathione
S-transferase

Diagnostic biologique

Imagerie

Stratégie
diagnostique ?

L'abdomen sans préparation ?

- Inapproprié...
- Les anomalies sont souvent tardives traduisant une nécrose intestinale :
  - grisaille abdominale diffuse (Sensibilité nulle....)
  - aérogrélie diffuse, pneumopéritoine
  - exceptionnellement une aéroportie

Smerud et al, Am J Roentgenol, 1990
Meyers et al, Gastrointest radiol, 1977

TDM

Stratégie
diagnostique ?

Savoir évoquer l'ischémie mésentérique

Confirmer l'ischémie mésentérique
IMAGERIE

1. S'agit t'il d'une ischémie mésentérique aigüe (arguments directs et indirects d'imagerie) ?
2. Quels sont les segments digestifs touchés (topographie)?
3. Cette obstruction est-elle artérielle ou veineuse ? Si elle est artérielle, peut on retrouver une (des) embolies, le site d'une thrombose ?
4. Existe -t-il des signes de perforation, de péritonite ?

A C
B D

TDM

Stratégie
diagnostique ?

L'angioTDM : la référence ?

*Sans injection + Temps artériel 30s + parenchymateux 70s + tardif 3min
Résolution CT64 barrettes : 0,4 mm*

Paroi anses grêles
Vaisseaux
mésentériques
Mésentère
Dilatation TD
Organes pleins

- Diagnostic positif
- Diagnostic différentiel
- Diagnostic étiologique

Se 96 %
Sp 94%

- Normal, il n'élimine pas le diagnostic d'ischémie mésentérique aigüe

*Michel C et al, J Radiol, 2001
Kirkpatrick, Radiology, 2003*

Thrombose
VMS
15%

la thrombose veineuse, diagnostic TDM le plus facile...

Thrombose de la VMS (hyperdensité spontanée, élargissement du calibre, défaut de rehaussement intraluminaire...)

Épaississement >3 mm (target cible) et circonférentiel de la paroi du grêle

Le degré de l'épaississement n'est pas corrélé à la sévérité de l'ischémie

Œdème le + svt réversible

Occlusion
artérielle

L'occlusion artérielle au TDM

Embolie Thrombose AMS
20-30% 50%

*Amincissement
de la paroi du
grêle*

*Epaississement
seulement si
reperfusion*

*NON SPECIFIQUE :
Pneumatose (linéaire > kystique)
Aéroportie, Aéromésentérie*

L'occlusion artérielle au TDM

Embolie
20-30%

Thrombose AMS
50%

Mise en évidence (rare) d'une ou plusieurs images d'emboles artériels (multiplicité de territoires différents au sein de l'AMS, dans d'autres territoires artériels).

IMA NO
15%

L' IMA non occlusive au TDM

*Epaississement fréquent
(ischémie – reperfusion simultanée)*

Atteinte colique associée +++

- *Absence d'image de thrombus ou d'embolie artériel mésentérique*
- *un net retard dans la cinétique de l'opacification viscérale et notamment digestive (territoire AMI + AMS par exemple)*

La tonométrie gastrique

- Diagnostic d'ischémie chronique
- Dépistage de l'ischémie aigüe en réanimation ?
- Monitoring post traitement de l'IMA en réanimation

ACC/AHA 2005 Practice Guidelines for the Management of Patients With Peripheral Arterial Disease (Lower Extremity, Renal, Mesenteric, and Abdominal Aortic): A Collaborative Report from the American Association for Vascular Surgery/Society for Vascular Surgery,* Society for Cardiovascular Angiography and Interventions, Society for Vascular Medicine and Biology, Society of Interventional Radiology, and the ACC/AHA Task Force on Practice Guidelines (Writing Committee to Develop Guidelines for the Management of Patients With Peripheral Arterial Disease): Endorsed by the American Association of Cardiovascular and Pulmonary Rehabilitation; National Heart, Lung, and Blood Institute; Society for Vascular Nursing; TransAtlantic Inter-Society Consensus; and Vascular Disease Foundation

Alan T. Hirsch, Ziv J. Haskal, Norman R. Hertzner, Curtis W. Bakal, Mark A. Creager, Jonathan L. Halperin, Loren F. Hiratzka, William R.C. Murphy, Jeffrey W. Olin, Jules B. Puschett, Kenneth A. Rosenfield, David Sacks, James C. Stanley, Lloyd M. Taylor, Jr, Christopher J. White, John White and Rodney A. White

“This means that there are **no randomized or controlled trials of diagnosis or therapy for intestinal ischemia, acute or chronic, regardless of cause. There are important gaps in our knowledge of the natural history of intestinal ischemia, especially with regard to the number of persons with asymptomatic intestinal arterial obstructions who eventually become symptomatic** ».

Traitement

OPTIMISER L'OXYGENATION SPLANCHNIQUE

- Patient à jeun
- Contrôle hémodynamique
  - Privilégier la volémie initialement (Echocoeur)
  - Vasconstricteurs uniquement si volémie optimisée
    - Inévitable si choc septique
    - Intérêt DOBUTAMINE associé NORADRENALINE ?
    - DOPEXAMINE ? DOPAMINE ?
    - Anti-endothéline ?
- Antalgiques
- Antibiothérapie large spectre
- Débuter l'anticogulation /héparine IVSE

Acute Mesenteric Ischemia

A Clinical Review

W. Andrew Oldenburg, MD; L. Louis Lau, MD; Thomas J. Rodenberg, MD;
Hope J. Edmonds, MD; Charles D. Burger, MD

Table 1. Physiologic and Pharmacologic Factors Regulating Mesenteric Blood Flow (Extrinsic Regulatory System)

Decrease Blood Flow		Increase Blood Flow
Humoral (Endogenous and Exogenous)		
Epinephrine (high dose)		Epinephrine (low dose)
Norepinephrine (moderate to high dose)		Norepinephrine (low dose)
Dopamine (high dose)		Dopamine (low dose)
Phenylephrine		Dobutamine
Vasopressin		Sodium nitroprusside
Angiotensin II		Papaverine
Digoxin		Nitric oxide
Neural		
α -Adrenergic receptors		β -Adrenergic receptors
Dopaminergic receptors		

CHEST

Official publication of the American College of Chest Physicians

Dopexamine, Dobutamine, and Dopamine Increase Splanchnic Blood Flow

Le choix
des
amines ?

Alan Lisbon

Chest 2003;123;460S-463S

DOI 10.1378/chest.123.5_suppl.460S

Early identification of gut ischemia is an important step in preventing the development of multiple organ failure and its associated mortality. Inotropic agents have been suggested to play a role in correcting the problem of inadequate splanchnic blood flow. The evidence presented here demonstrates that dopexamine increases splanchnic blood flow and usually increases pHi in sepsis. Dopexamine may also have other beneficial effects on the gut, not clearly elucidated at this time. Further evidence of the positive effects of dopexamine are seen in investigations of its use in CPB, where dopexamine increases splanchnic blood flow. Dobutamine also increases splanchnic blood flow after CPB, also not as a fraction of cardiac output. In contrast, DA increases splanchnic blood flow in sepsis, but not after CPB.

Traitement

Bradbury, Br J Surg, 1995

Martinez, Emerg Med Clin North Am, 2004

Alternatives thérapeutiques

Brountzos EN, et al.
Cardiovasc Intervent Radiol 2001

Wakabayashi H, Shiode T, Kurose M, et al. *Emergent treatment of acute embolic superior mesenteric ischemia with combination of thrombolysis and angioplasty: report of two cases. Cardiovasc Intervent Radiol* 2004 ; 27 : 389-93.

Modern treatment of acute mesenteric ischaemia

S. Acosta¹ and M. Björck²

¹Vascular Centre, Skåne University Hospital, Malmö, and ²Vascular Surgery, Department of Surgical Sciences, Uppsala University, Uppsala, Sweden
Correspondence to: Dr S. Acosta, Vascular Centre, Skåne University Hospital, S205 02 Malmö, Sweden (e-mail: stefan.acosta@telia.com)

a Embolus in SMA

b After local aspiration and nitroglycerine injection

Prise en charge chirurgicale

Laparotomie médiane

1. **Evaluer la viabilité intestinale**
2. Diagnostic lésionnel
3. Revascularisation mésentérique
4. Resection de la nécrose intestinale
5. Laparotomie de Second look

- ale
- Jugement clinique
muqueuse rose, peristaltisme visible, pulsatilité, test de saignement
Ballard JL, et al. Am Surg 1993
  - Doppler per opératoire
Hobson RW, et al. J Surg Res 1976
  - Test à la fluoresceine
Bergman RT, et al. Ann Vasc Surg 1992

Prise en charge chirurgicale

Laparotomie médiane

1. Evaluer la viabilité intestinale
2. Diagnostic lésionnel
3. Revascularisation mésentérique
4. Resection de la nécrose intestinale
5. Laparotomie de Second look

- Pulsatilité du tronc de l'AMS :
  - absence = thrombose
  - présence proximale mais non distale = embolie ?

Prise en charge chirurgicale

Laparotomie médiane

1. **Evaluer la viabilité intestinale**

2. Diagnostic lésionnel

**3. Revascularisation
mésentérique**

4. Resection de la nécrose
intestinale

5. Laparotomie de Second look

- Embolie
  - artériotomie puis embolectomie +- patch veineux
- Thrombose
  - Thombendartériectomie PUIS
  - pontage (autologue ou prothétique)
ou
  - réimplantation de l'AMS
+++

*Foley MI, et al. J Vasc Surg 2000
Bradbury AW, et al. Br J Surg 1995
Testart J, et al. Int Angiol 1992*

Prise en charge chirurgicale

Laparotomie médiane

- 1. Evaluer la viabilité intestinale**
2. Diagnostic lésionnel
3. Revascularisation mésentérique
- 4. Résection de la nécrose intestinale**
5. Laparotomie de Second look

- Pas d'anastomose directe, type de stomies discutable

*Foley MI, et al. J Vasc Surg 2000
Bradbury AW, et al. Br J Surg 1995
Testart J, et al. Int Angiol 1992*

Prise en charge chirurgicale

Laparotomie médiane

1. **Evaluer la viabilité intestinale**
2. Diagnostic lésionnel
3. Revascularisation mésentérique
4. Resection de la nécrose intestinale
5. **Laparotomie de « Second look »**

- systématique à 24-48h ?
  - Permet la réévaluation de la viabilité
  - Réduit la mortalité ?

Levy PJ, et al. Surg Gynecol Obstet 1990

- Si évolution clinique défavorable ?
  - mortalité dramatique si reprise pour évolution défavorable

Hagmuller GW, et al. Langenbecks Arch Chir 1990

Traitement

Ischémie non occlusive Recommandations

- **Recommandations de Classe I (Niveau de preuve C)**
  - Le traitement de l'état de choc sous-jacent est l'étape principale du traitement de l'IMNO
  - La laparotomie et la résection des segments non viables sont indiquées chez les patients avec IMNO et chez qui les symptômes persistent malgré le traitement (Niveau de preuve B)
- **Recommandation de Classe IIa :**
  - Un traitement intra-artériel percutané vasodilatateur est indiquée chez les patients avec IMNO qui ne répondent pas au traitement intensif et ceux dont l'ischémie est due à la cocaïne ou à l'ergot (Niveau de preuve B)

Hirsch AT, Haskal ZJ, Hertzler NR et al (2006) ACC/AHA 2005 Practice Guidelines for the management of patients with peripheral arterial disease (lower extremity, renal, mesenteric, and abdominal aortic) *Circulation* 113: e463-654

Conclusion

- Pathologie peu fréquente
  - Pronostic sévère
  - Diagnostic difficile
  - PEC précoce
  - Techniques de revascularisation ++
-