Prise en charge de l'arrêt cardiaque en 2015

Pr Benoît VIVIEN

SAMU de Paris

Département d'Anesthésie Réanimation

Université Paris Descartes - Paris V

Hôpital Necker - Enfants Malades

Conflits d'intérêt

- Astra-Zeneca
- Elsevier
- Hutchinson Technology
- Lilly
- Merck-Serono
- Novartis
- Teleflex
- Vidacare

Epidémiologie

- **Cardiopathies ischémiques = 1^{ère} cause de décès**
- **Maladies cardiovasculaires -> 40% des décès < 75 ans**
- **Mort subite de l'adulte :**
 - 40 000 à 50 000 décès / an en France
 - responsable de 60% des décès des adultes coronariens
- **Taux de survie à la sortie de l'hôpital :**
 - 5 à 8 % quel que soit le rythme initial
 - Jusqu'à 50-70 % si rythme initial = FV ET CEE dans les 3-5 min.

Processus d'élaboration des recommandations de l'ILCOR

- **1992 : International Liaison Committee on Resuscitation**
- **2000 : 1^{ères} recommandations internationales**
- **Actualisation / 5 ans**
- **2015 : priorisation de 165 « points clés »**
 - **existence de nouvelles preuves scientifiques**
 - **Evaluation PICO (Population, Intervention, Comparator, Outcome)**
 - **Cotation GRADE (Grading of Recommendations Assessment Development and Evaluation)**
- **A partir de 2015 : Actualisations et publications régulières on line**

Processus d'élaboration des recommandations de l'ILCOR

2015 Guidelines Update: Master List of Recommendations, *Continued*

Year Last Reviewed	Topic	Recommendation	Comments
2015	Prognostic Testing in Adult Patients After Cardiac Arrest: Blood Markers	When performed with other prognostic tests at 72 hours or more after cardiac arrest, it may be reasonable to consider high serum values of NSE at 48 to 72 hours after cardiac arrest to support the prognosis of a poor neurologic outcome (Class IIb, LOE B-NR), especially if repeated sampling reveals persistently high values (Class IIb, LOE C-LD).	updated for 2015
2015	Ethics of Organ and Tissue Donation	We recommend that all patients who are resuscitated from cardiac arrest but who subsequently progress to death or brain death be evaluated for organ donation (Class I, LOE B-NR).	updated for 2015
2015	Ethics of Organ and Tissue Donation	Patients who do not have ROSC after resuscitation efforts and who would otherwise have termination of efforts may be considered candidates for kidney or liver donation in settings where programs exist (Class IIb, LOE B-NR).	new for 2015
The following recommendations were not reviewed in 2015. For more information, see the <i>2010 AHA Guidelines for CPR and ECC</i> , "Part 3: Ethics."			
2010	Principle of Futility	Conditions such as irreversible brain damage or brain death cannot be reliably assessed or predicted at the time of cardiac arrest. Withholding resuscitation and the discontinuation of life-sustaining treatment during or after resuscitation are ethically equivalent. In situations where the prognosis is uncertain, a trial of treatment may be initiated while further information is gathered to help determine the likelihood of survival, the patient's preferences, and the expected clinical course (Class IIb, LOE C).	not reviewed in 2015

**Recommandations
internationales ...**

**... Et
Françaises**

De 1950 ... à 2015

1961 Baltimore

Kouwenhoven & Knickerbocker

- 1) Alerte immédiate
- 2) RCP basique immédiate
- 3) Défibrillation (automatique)
- 4) RCP spécialisée
- 5) Soins spécialisés post-AC

Formation du grand public

- Formation indispensable

- Appréhension +++

 - Peur de mal faire

 - Peur des maladies transmissibles

- Formations interactives avec recyclages réguliers

- Formation au MCE en 1^{ère} intention

 - Formation à la ventilation = 2^{ème} tps

- Pour les témoins non formés :

 - Incitation à la RCP par téléphone

Importance de la reconnaissance de l'AC au téléphone

- Par la régulation du SAMU
- Avec un protocole standardisé
- Description des signes de vie observés par les témoins
- Importance de la reconnaissance des gasps et de la cyanose
 - Berdowski et al. *Circulation* 2009
 - Roppolo L et al. *Resuscitation* 2009
 - Bohm K et al. *Resuscitation* 2009
- Incitation à la RCP par les témoins +++

Diagnostic de l'AC

- **Recommandations 2005 :**
 - Une victime inconsciente,
 - Qui ne bouge pas et ne répond pas,
 - Qui ne respire pas ou respire de manière agonique (gasps),
 - Et pour les secouristes et les professionnels de santé sur l'absence de pouls carotidien ou fémoral
- **Recommandations 2010 et 2015 :**
 - Toute victime inconsciente,
 - Qui ne respire pas ou respire anormalement

AC Extra-hospitalier VS Intra-hospitalier

**ACEH = Événement inopiné
=> stratégie de PEC réactive**

**ACIH = Événement « iatrogène »
=> stratégie de prévention**

Réanimation cardio-pulmonaire de base

- Chaque minute d'AC sans RCP induit une réduction des chances de survie de 7 à 10 %
- La précocité et la poursuite de la RCP avec le minimum d'interruption, est essentielle pour le pronostic
- Nécessité d'une simplification des gestes pour faciliter l'enseignement à grande échelle :
 - Au grand public
 - Aux professionnels de santé non spécialisés

Ventilation

- **La ventilation a des effets délétères directs et indirects**

- Effet hémodynamique propre = baisse du retour veineux
- Risque d'inhalation gastrique
- Nécessité d'une interruption du MCE
- Perte de temps parfois importante
- Appréhension / refus du bouche-à-bouche

- **Conséquences majeures pour le grand public non formé**

- Au mieux : ventilation mal faite qui fait perdre du temps de MCE
- Au pire : refus de pratiquer toute manœuvre de RCP même le MCE

Ventilation

- La ventilation n'est pas immédiatement nécessaire chez l'adulte pour un AC d'origine cardiaque
 - Réserves d'oxygène suffisantes pendant ~ 5 minutes
 - Initialement le MCE seul permet d'assurer une oxygénation correcte

Ventilation

- Confirmation clinique de l'efficacité initiale du MCE seul sans la ventilation

SOS Kanto group Lancet 2007

Survie (%)

Rea TD et al. N Engl J Med 2010

Ventilation

- La ventilation reste nécessaire en cas d'AC :
 - D'origine asphyxique (asthme, noyade ...)
 - Chez l'enfant

La ventilation dans la RCP de base en 2015

- Pour le grand public, la ventilation n'est plus recommandée systématiquement
- Chez l'adulte, la RCP commence par le MCE
 - Les 2 insufflations initiales ne sont plus nécessaires
- Chaque insufflation est réalisée en 1 seconde
- Le rapport compression / ventilation est modifié pour favoriser la durée du MCE : 30 / 2 chez l'adulte
- La ventilation reste indispensable
 - En cas d'AC d'origine asphyxique
 - Chez l'enfant : 5 insufflations initiales, puis rythme 15 / 2

Le massage cardiaque externe

Massage cardiaque externe

- **Le MCE doit être le plus continu possible**
 - Limitation des interruptions au strict minimum
 - Reprise du MCE le plus vite possible après chaque interruption
 - Doit représenter au moins 60% du temps de la RCP avant IOT
- **La fréquence du MCE est entre 100 et 120 / min**
- **La dépression du thorax doit être entre 5 et 6 cm**
 - Ou 1/3 du thorax chez l'enfant
- **Importance de la période de relaxation du thorax**
 - Temps égal pour la compression et la relaxation
 - Sans maintenir l'appui sur le thorax

Massage cardiaque externe

⚠ MCE moins efficace si décompression incomplète

Massage cardiaque externe

- Pour réaliser le MCE la technique la plus simple et la plus didactique a été retenue :
 - Se placer perpendiculairement au patient, genoux contre le thorax
 - Positionner ses épaules au-dessus du thorax du patient
 - Placer les paumes de la main l' une sur l' autre au centre du thorax
 - Garder les bras tendus
 - Effectuer les compressions thoraciques en « appuyant fort » et régulièrement = 100 à 120 /min

Pression aortique au cours de la RCP de base : Effet de la Ventilation

- Efficacité progressive du MCE
- Effet catastrophique de l'arrêt du MCE pour la ventilation
- Compromis actuel = 30 / 2

Comparaison expérimentale de l'efficacité hémodynamique des séquences 15 / 2 et 30 / 2

- 20 cochons randomisés
- RCP 15 / 2 vs 30 / 2

Amélioration hémodynamique significative avec séquence 30 / 2

- ↑ Pression de perfusion coronaire
- ↑ Débit carotidien

Algorithme de la RCP de base

Défibrillation

- Indiquée en cas d'AC par « rythme choquable »
 - Fibrillation Ventriculaire (FV)
 - Tachycardie Ventriculaire (TV) sans pouls

Défibrillation

Défibrillation Manuelle

Réanimations
Soins intensifs
SMUR

Défibrillation Automatique Externe (DAE)

Défibrillateur
Semi-
Automatique
(DSA)

Médecins
Paramédicaux
Secouristes

Défibrillateur
Entièrement
Automatique
(DEA)

Libre accès
dans les lieux
publics

Défibrillation Automatisée Externe Réglementation 2007

5 mai 2007

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Texte 56 sur 173

Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SOLIDARITÉS

Décret n° 2007-705 du 4 mai 2007 relatif à l'utilisation des défibrillateurs automatisés externes par des personnes non médecins et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires)

« *Art. R. 6311-14.* – Les défibrillateurs automatisés externes, qui sont au sens de la présente section les défibrillateurs externes entièrement automatiques et les défibrillateurs externes semi-automatiques, sont un dispositif médical dont la mise sur le marché est autorisée suivant les dispositions du titre I^{er} du livre II de la partie V du présent code et permettant d'effectuer :

« *Art. R. 6311-15.* – Toute personne, même non médecin, est habilitée à utiliser un défibrillateur automatisé externe répondant aux caractéristiques définies à l'article R. 6311-14. »

Pronostic des AC après Défibrillation rapide par les officiers de sécurité des Casinos

- DSA dans 32 casinos de Las Vegas pendant 32 mois
- Formation des personnels : 8 heures
- Système de surveillance très performant par vidéo
- 148 AC : 105 FV, 17 RSP, 26 asystoles
- 90 FV devant témoins : Survie 59 %
 - Mise place DSA : $3,5 \pm 2,9$ min
 - Premier choc : $4,4 \pm 2,9$ min
 - Arrivée des Paramedics : $9,8 \pm 4,3$ min
- **74 % de survie si défibrillation < 3 min**

Principale limite de la défibrillation par le public

Laboratoires
d'explorations
cardiaques

DAE au domicile des patients à risque

ORIGINAL ARTICLE

Home Use of Automated External Defibrillators for Sudden Cardiac Arrest

N Engl J Med 2008; 358:1793-1804

Gust H. Bardy, M.D., Kerry L. Lee, Ph.D., Daniel B. Mark, M.D., M.P.H., Jeanne E. Poole, M.D., William D. Toff, M.D., Andrew M. Tonkin, M.D., Warren Smith, M.B., Ch.B., Paul Dorian, M.D., Douglas L. Packer, M.D., Roger D. White, M.D., W.T. Longstreth, Jr., M.D., Jill Anderson, R.N., B.S.N., George Johnson, B.S.E.E., Eric Bischoff, B.A., Julie J. Yallop, Ph.D., Steven McNulty, M.S., Linda Davidson Ray, M.A., Nancy E. Clapp-Channing, R.N., M.P.H., Yves Rosenberg, M.D., and Eleanor B. Schron, R.N., Ph.D. for the HAT Investigators

- 7001 patients post-IDM antérieur sans indication de défibrillateur implantable
- Comparaison PEC standard *versus* DAE au domicile
- > 450 DC, 1/3 morts subites
- > Pas de différence de survie

Programme ciblé de mise en place de DAE

- 10,9 millions de coureurs (2000-2010)
- > 59 AC en 10 ans
- > incidence = 0,54 / 100 000

Cardiac Arrest during Long-Distance Running Races

N Engl J Med 2012;366:130-40.

Jonathan H. Kim, M.D., Rajeev Malhotra, M.D., George Chiampas, D.O., Pierre d'Hemecourt, M.D., Chris Troyanos, A.T.C., John Cianca, M.D., Rex N. Smith, M.D., Thomas J. Wang, M.D., William O. Roberts, M.D., Paul D. Thompson, M.D., and Aaron L. Baggish, M.D.,
for the Race Associated Cardiac Arrest Event Registry (RACER) Study Group

Table 3. Demographic Characteristics, Running History, Clinical Characteristics, Emergency Medical Treatment, and Cause of Cardiac Arrest among Nonsurvivors and Survivors.*

Variable	Nonsurvivors (N=23)	Survivors (N=8)	P Value†	Odds Ratio (95% CI)‡
Emergency medical treatment				
Bystander-administered CPR performed — no. (%)	10 (43)	8 (100)	0.01	
Time to initiation of CPR — min	5.2±4.0	1.5±1.4	0.06	1.51 (0.99–2.30)
Time to emergency-medical-service arrival — min	7.7±6.7	3.9±2.7	0.13	
Initially documented cardiac rhythm — no. (%)				
Ventricular fibrillation or ventricular tachycardia	6 (26)	7 (88)	0.01	0.05 (0.01–0.50)
Pulseless electrical activity, asystole, or other	17 (74)	1 (13)	0.01	19.8 (2.0–196.4)
Automatic external defibrillator used on scene	8 (35)	7 (88)	0.03	0.08 (0.01–0.73)
Autopsy and clinical findings after cardiac arrest — no. (%)				
Definite or probable hypertrophic cardiomyopathy	15 (65)	0	0.002	
Ischemic heart disease	4 (17)	5 (63)	0.02	0.13 (0.02–0.76)

-> Efficacité de la mise en place systématique de DAE +++

Onde biphasique ou monophasique ?

- 169 ACR préhospitaliers à Toronto
 - CEE par onde biphasique *versus* monophasique
- => Amélioration de la survie à 24 H des patients défibrillés par onde biphasique de 4 à 10 min. post-AC**
- > 52% vs 34% p=0,01**

Quelle énergie pour la Défibrillation ?

- Défibrillateurs recommandés actuellement
= appareils à onde biphasique
- Énergie = 150 à 200 joules en biphasique
 - Si appareil monophasique -> 360 joules
- La même énergie est utilisée pour le 1^{er} et le 2^{ème} choc
- L'énergie peut éventuellement être augmentée pour les chocs suivants si le défibrillateur le permet (= manuel)

RCP avant le Choc ou Choc d'emblée ?

- 200 patients en AC à Oslo
- La RCP d'emblée améliore le pronostic si AC > 5 min.

- Mais résultats non confirmés par 2 études ultérieures

Wik L et al. JAMA 2003

	1 ^{er} Traitement	Survie (%)	p
Baker 2008	RCP (n=97) Choc (n=105)	10.3 17.1	0.16
Jacobs 2005	RCP (n=119) Choc (n=137)	4.2 5.1	0.47

Défibrillation selon les recommandations 2015

- RCP systématique d'emblée inutile
 - Le MCE doit être initié au plus tôt et poursuivi jusqu'à l'arrivée du DAE
 - Le CEE est effectué dès que le défibrillateur est disponible

Défibrillation selon les recommandations 2015

- RCP systématique d'emblée inutile

- Le MCE doit être initié au plus tôt et poursuivi jusqu'à l'arrivée du DAE
- Le CEE est effectué dès que le défibrillateur est disponible

- Il faut préserver au maximum la continuité du MCE

- Poursuite du MCE pendant la charge du défibrillateur
- Arrêt MCE < 5 sec pour le CEE
- Reprise MCE immédiate sans prise du pouls

=> pas de danger si RACS *versus*

↑ no-flow si AC persistant sans MCE

Défibrillation initiale 2000 VS 2015

2000

**Monophasique
200 J**

200 J

360 J

RCP 1 min

2015

RCP ≠ 2 min

**Biphasique
150-200J**

RCP 2 min

Poursuite du massage pendant le CEE ?

Hands-On Defibrillation

An Analysis of Electrical Current Flow Through Rescuers in Direct Contact With Patients During Biphasic External Defibrillation

Michael S. Lloyd, MD; Brian Heeke, BS; Paul F. Walter, MD; Jonathan J. Langberg, MD

Circulation. 2008;117: 2510-2514

-> OUI si CEE biphasique
et port de gants de soins
=> Continuité du MCE ++

~~Poursuite du massage pendant le CEE ?~~

Do clinical examination gloves provide adequate electrical insulation for safe hands-on defibrillation? I: Resistive properties of nitrile gloves[☆]

Charles D. Deakin^{a,*}, Victoria Lee-Shrewsbury^b, Kitwani Hogg^b, Graham W. Petley^c

Resuscitation xxx (2013) xxx-xxx

Circulation. 2008;117: 2510-2514

Jonathan J. Langberg, MD

-> NON car les propriétés isolantes des gants de soins sont insuffisantes + dégradation durant le MCE

La RCP

Médicalisée

Appliquer l' algorithme de la RCP de base et / ou de DAE RCP 30:2

Mettre en place l' électrocardioscope défibrillateur

Analyser le rythme cardiaque

Rythme Choquable
FV TV sans pouls

Réaliser 1 choc
150 -200 J biphasique

Reprendre
immédiatement la
RCP 30:2
Jusqu' à 2 min

Rythme NON Choquable
RSP, asystole

Reprendre
immédiatement la
RCP 30:2
Pendant 2 min

Pendant la RCP

- Contrôler les voies aériennes et ventiler en oxygène pur
- Vérifier la position et le contact des électrodes
- Traiter d' une éventuelle cause réversible
- Réaliser les compressions thoraciques en continu dès que les voies aériennes sont contrôlées
- Injecter le vasopresseur Adrénaline IV toutes les 3 - 5 min
- Envisager un antiarythmique (amiodarone 300 mg) et d' éventuels traitements spécifiques
- Monitorer et adapter
 - CO2 expiré
 - Température, glycémie, électrolytes, après ROSC

Causes réversibles

• Hypoxie	• Thrombose coronaire, pulmonaire
• Hypovolémie	• Pneumothorax suffocant
• Hypo / hyper kaliémie	• Tamponnade
• Hypothermie	• intoxications

Détail de l' algorithme de la RCP médicalisée

Pendant la RCP

- Contrôler les voies aériennes et ventiler en oxygène pur
- Vérifier la position et le contact des électrodes
- Traitement d' une éventuelle cause réversible
- Réaliser les compressions thoraciques en continu dès que les voies aériennes sont contrôlées
- Injecter le vasopresseur Adrénaline IV toutes les 3 - 5 min
- Envisager un antiarythmique (amiodarone 300 mg) et d' éventuels traitements spécifiques
- Monitorer et adapter
 - CO2 expiré
 - Température, glycémie, électrolytes, après RACS

MCE automatisé

-> Le MCE automatisé n'est pas une thérapeutique !!!

MCE automatisé

-> Le MCE automatisé n'est pas une thérapie !!!

MCE automatisé

-> Le MCE automatisé n'est pas une thérapie !!!

Ventilation

- Pour les anglo-saxons l'intubation peut être remplacée par des alternatives plus simples pour les « paramedics »
- En France, l'IOT reste la technique de référence
- En cas de difficulté d'intubation :
 - Ventilation avec masque facial, Guédel, BAVU et oxygène
 - Masque laryngé et Fastrach[®] = alternatives acceptables si l'intubation se révèle impossible
- Après intubation : l'alternance 30 / 2 est inutile et donc le MCE doit être continu et indépendant de la ventilation

Voie intratrachéale

Endotracheal Epinephrine: A Call for Larger Doses

Yossi Manisterski, MD, Zvi Vaknin, MD, Ron Ben-Abraham, MD, Ori Efrati, MD, Danny Lotan, MD, Mati Berkovitch, MD, Asher Barak, MD, Zohar Barzilay, MD, FCCM, and Gideon Paret, MD
(Anesth Analg 2002;95:1037-41)

**VOIE INTRA-TRACHEALE
NON RECOMMANDÉE PAR L'ERC
CHEZ L'ADULTE DEPUIS 2010**

Voie intraosseuse

Comparison of intravenous and intraosseous access by pre-hospital medical emergency personnel with and without CBRN protective equipment[☆]

Lionel Lamhaut^a, Christelle Dagrón^a, Roxana Apriotesei^a, Jérôme Gouvernaire^a, Caroline Elie^b, Jean-Sébastien Marx^a, Caroline Télion^a, Benoît Vivien^{a,*}, Pierre Carli^a

- 20 sec

-> IO vs IV en conditions réelles ?

- Etude sur mannequin
- En salle de cours
- Eclairage optimal ...

Voie intraosseuse

Comparison of intravenous and intraosseous access by pre-hospital medical emergency personnel with and without CBRN protective equipment[☆]

Lionel Lamhaut^a, Christelle Dagrón^a, Roxana Apriotesei^a, Jérôme Gouvernaire^a, Caroline Elie^b, Jean-Sébastien Marx^a, Caroline Télion^a, Benoît Vivien^{a,*}, Pierre Carli^a

-> IO vs IV en conditions réelles ?

**VOIE INTRA-OSSEUSE
RECOMMANDÉE SI ABORD VASCULAIRE
PÉRIPHÉRIQUE DIFFICILE / IMPOSSIBLE**

- Etude sur mannequin
- En salle de cours
- Eclairage optimal ...

RCP sans adrénaline ?

Intravenous Drug Administration During Out-of-Hospital Cardiac Arrest A Randomized Trial

JAMA. 2009;302(20):2222-2229

Theresa M. Olasveengen, MD

Figure 2. Cumulative Survival for Up to 1 Year After Cardiac Arrest

Pour ou contre l'adrénaline ?

Prehospital Epinephrine Use and Survival Among Patients With Out-of-Hospital Cardiac Arrest

Akihito Hagihara, DMSc, MPH

JAMA. 2012;307(11):1161-1168

Figure 2. Results of Unconditional Logistic Regression Analyses Comparing Prehospital Epinephrine Use vs No Prehospital Epinephrine Use in Patients With Out-of-Hospital Cardiac Arrest

Adrénaline en 2015

- **Pour la FV et la TV**
 - 1 mg d'adrénaline IV si la FV / TV persiste après le(s) CEE
 - Reco. AHA : SANS timing précis (priorité à la défibrillation)
 - Reco. ERC : après le 3^{ème} CEE
 - Puis 1 mg toutes les 3 à 5 min. si le trouble du rythme persiste
- **Rythme sans pouls et asystole**
 - 1 mg d'adrénaline IV dès qu'une voie IV / IO est obtenue
 - Puis 1 mg toutes les 3 à 5 min. jusqu'à ce qu'il y ait le retour à une circulation spontanée

Vasopressine

- 2894 patients en ACEH
- > 1 mg adr. + 40 UI vasopressine
versus 1 mg adr. + placebo
- > Pas de diffrence significative
- > Victoire par dfaut de l'adrnaline
sur la vasopressine

ORIGINAL ARTICLE

Vasopressin and Epinephrine vs. Epinephrine Alone in Cardiopulmonary Resuscitation

Pierre-Yves Gueugniaud, M.D., Ph.D., Jean-Stphane David, M.D., Ph.D., Eric Chanzy, M.D., Herv Hubert, Ph.D., Pierre-Yves Dubien, M.D., Patrick Mauriaucourt, M.D., Coralie Bragana, M.D., Xavier Billres, M.D., Marie-Paule Clotteau-Lambert, M.D., Patrick Fuster, M.D., Didier Thiercelin, M.D., Guillaume Debaty, M.D., Agns Ricard-Hibon, M.D., Patrick Roux, M.D., Catherine Espesson, M.D., Emgan Querellou, M.D., Laurent Ducros, M.D., Patrick Ecollan, M.D., Laurent Halbout, M.D., Dominique Savary, M.D., Frdric Guillaume, M.D., Rgine Maupoint, M.D., Philippe Capelle, M.D., Ccile Bracq, M.D., Philippe Dreyfus, M.D., Philippe Nougulier, M.D., Antoine Gache, M.D., Claude Meurisse, M.D., Bertrand Boulanger, M.D., Claude Lae, M.D., Jacques Metzger, M.D., Valrie Raphael, M.D., Arielle Beruben, M.D., Volker Wenzel, M.D., Comlavi Guinhouya, Ph.D., Christian Vilhelm, Ph.D., and Emmanuel Marret, M.D.

N ENGL J MED 359;1 WWW.NEJM.ORG JULY 3, 2008

Table 2. Survival Data for the 2894 Patients in the Intention-to-Treat Population.*

End Point	Combination Treatment (N=1442)	Epinephrine Only (N=1452)	Relative Risk of Death (95% CI)	P Value
Survival to hospital admission — no. (%)	299 (20.7)	310 (21.3)	1.01 (0.97–1.05)	0.69
Survival to return of spontaneous circulation — no. (%)	413 (28.6)	428 (29.5)	1.01 (0.97–1.06)	0.62
Survival to hospital discharge — no./total no. (%)	24/1439 (1.7)	33/1448 (2.3)	1.01 (1.00–1.02)	0.24
1-Year survival — no./total no. (%)	18/1437 (1.3)	30/1447 (2.1)	1.01 (1.00–1.02)	0.09
Good neurologic recovery at hospital discharge — no./total no. (%)†	9/24 (37.5)	17/33 (51.5)	1.29 (0.81–2.06)	0.29

* CI denotes confidence interval.

† Good neurologic recovery was defined as cerebral performance category 1 (conscious with normal function or only slight disability).

Antiarythmiques en 2015

- Si la FV / TV persiste après 3 CEE, il faut injecter 300 mg d'amiodarone en bolus IV
 - La dose ultérieure de 150 mg peut être administrée pour une FV / TV réfractaire, éventuellement suivie par une perfusion de 900 mg sur 24 h.
- Si l'amiodarone n'est pas disponible, la lidocaïne à la dose de 1-1,5 mg/kg peut être utilisée
- Pas d'indication pour le MgSO₄

Algorithme pour un rythme « choquable »

Rythme « choquable » en service spécialisé

- Chirurgie cardiaque
- Salle de coronarographie
- Patient monitoré

...

**-> Possibilité d'effectuer jusqu'à 3 CEE successifs
= sans reprise du MCE entre les chocs**

Algorithme pour un rythme « non-choquable »

Traitement des étiologies curables d' AC

- Hypoxie
- Hypovolémie
- Hypo/hyperkaliémie
- Hypothermie
- Pneumothorax suffocant
- Tamponnade
- Intoxications
- Embolie / obstacle mécanique

**Un traitement spécifique de la cause
favorise le succès de la réanimation +++**

Thrombolyse systématique dans l'AC extra-hospitalier ?

- 827 patients en AC extra-hospitalier
- prise en charge par une équipe médicale

Thrombolyse et Arrêt Cardiaque en 2015

- La thrombolyse systématique n'est pas indiquée
- La thrombolyse est indiquée si l'on pense que l'arrêt cardiaque est dû à une embolie pulmonaire
 - Mais elle n'est plus indiquée en cas d'AC sur Sd coronarien
- Le fait que la RCP soit en cours n'est pas une contre-indication à la thrombolyse
- La RCP doit être poursuivie pendant 60 à 90 min.
- La thrombolyse post-RACS reste d'actualité

Coronarographie post Arrêt Cardiaque

IMMEDIATE CORONARY

CHRISTIAN M. SPAULDING, M.D.,
SIMON N. WEBER, M.D.,

2010

- 84 patients a
- en coronarog
- arrêt cardiaq
- > lésions co
- > 40 occlusi
- > 28 succès
- > survie intr

-> Succès de
survie

endant de

Odd ratio = 0.6 [95% CI 0.4-0.9] P = 0.01

Prise en charge du « Post Resuscitation Syndrom »

- **Maladie complexe proche du sepsis et comprenant :**
 - **Un phénomène d'ischémie-reperfusion globale**
 - **Une réponse inflammatoire**
 - **Une dysfonction myocardique en partie réversible**
 - **Une insuffisance cortico-surrénalienne**
 - **Une coagulopathie**
- => Prise en charge spécialisé en réanimation, Hémodiffusion ...**

Protection cérébrale pharmacologique

Aucune molécule n'a prouvé son efficacité à ce jour

~~Thiopental~~

~~Brain Resuscitation Clinical Trial I Study Group. Randomized clinical study of thiopental loading in comatose survivors of cardiac arrest. N Engl J Med 1986 ; 314 : 397-403~~

~~Corticoïdes~~

~~Jastremski M, Sutton-Tyrrell K, Magenes P. Glucocorticoid treatment does not improve neurological recovery following cardiac arrest. Brain Resuscitation Clinical Trial I study Group. JAMA 1989 ; 262 : 3427-30~~

~~Nimodipine~~

~~Roine RO. Nimodipine after resuscitation from out-of-hospital ventricular fibrillation. A placebo-controlled double-blind randomized trial. J Am Med Assoc 1990 ; 264 : 3171-7~~

~~Lidoflazine~~

~~Brain Resuscitation Clinical Trial II Study Group. A randomized study of calcium entry blocker (lidoflazine) administration in the treatment of comatose survivors of cardiac arrest. N Engl J Med 1991 ; 324 : 1225-31~~

Protection cérébrale pharmacologique

Plusieurs molécules récemment testées ...

- Ciclosporine → ?
- Erythropoïétine
 - anti-apoptotique
 - anti-oxydant
 - inhibition du glutamate
 - anti-inflammatoire
 - neurotrophique
 - effet modulateur cellulaire
 - effet angiogénique

...

Hypothermie Thérapeutique Modérée en post-AC en 2010

- 275 patients en post-AC après FV
- Objectif de Température = 32-34° C

Hypothermie Thérapeutique en post-Arêt

- Les patients en arrêt cardiaque, inconscients, sans réponse aux réanimations cardiorespiratoires, sont refroidis à l'extérieur de l'hôpital dû à un arrêt cardiaque survenu à l'hôpital.
- Une hypothermie modérée peut améliorer les résultats chez les patients inconscients adultes.

P. Safar, Univ. of Pittsburgh 1961

l'extérieur de l'hôpital dû à un arrêt cardiaque survenu à l'hôpital.

HEART - LUNG RESUSCITATION

I FIRST AID: OXYGENATE THE BRAIN IMMEDIATELY

For 2 operators

IF UNCONSCIOUS
Airway - TILT HEAD BACK

IF NOT BREATHING
Breathe - INFLATE LUNGS 3-5 TIMES, MAINTAIN HEAD TILT
MOUTH-TO-MOUTH, MOUTH-TO-NOSE, mouth-to-adjunct, bag-mask

- o FEEL PULSE
- o IF PRESENT - CONTINUE LUNG INFLATIONS
- o IF ABSENT -

Circulate - COMPRESS HEART ONCE A SECOND. ALTERNATE 2-3 LUNG INFLATIONS WITH 15 STERNAL COMPRESSIONS UNTIL SPONTANEOUS PULSE RETURNS.

II START SPONTANEOUS CIRCULATION

for physicians only

Drugs - EPINEPHRINE: 1.0mg (1.0 CC OF 1:1000) I.V. OR 0.5mg INTRACARDIAC. REPEAT LARGER DOSE IF NECESSARY.

SODIUM BICARBONATE: APPROXIMATELY 3.75 G/50 CC (1/2 DOSE IN CHILDREN) I.V. REPEAT EVERY 5 MINUTES IF NECESSARY

E. K. G. - FIBRILLATION: EXTERNAL ELECTRIC DEFIBRILLATION REPEAT SHOCK EVERY 1-3 MINUTES UNTIL FIBRILLATION REVERSED

- IF ASYSTOLE OR WEAK BEATS: EPINEPHRINE OR CALCIUM I.V.

Fluids - I.V. PLASMA, DEXTRAN, SALINE
Do not interrupt cardiac compressions and ventilation. Tracheal intubation only when necessary. AFTER RETURN OF SPONTANEOUS CIRCULATION USE VASOPRESSORS AS NEEDED, e.g. NOREPINEPHRINE (Levophed) I.V. DRIP

III SUPPORT RECOVERY

(physician-specialist)

Gauge EVALUATE AND TREAT CAUSE OF 'ARREST'

Hypothermia START WITHIN 30 MINUTES IF NO SIGN OF CNS RECOVERY

Intensive Care SUPPORT VENTILATION: TRACHEOTOMY, PROLONGED CONTROLLED VENTILATION, GASTRIC TUBE AS NECESSARY

SUPPORT CIRCULATION
CONTROL CONVULSIONS
MONITOR

Figure 1. Heart-lung resuscitation (cardiopulmonary-cerebral resuscitation). First composition in 1961, Pittsburgh, PA. Reproduced with permission from Safar P: Community-wide CPR. J Iowa Medical Society 1964 (Nov); pp 629-635.

ORIGINAL ARTICLE

Targeted Temperature Management at 33°C versus 36°C after Cardiac Arrest

Niklas Nielsen, M.D., Ph.D., Jørn V.
David Erlinge, M.D., Ph.D., Yvan
Janneke Horn, M.D.
Jesper Kjaergaard, M.D., D.M.Sci.,
Pascal Stammet, M.D., Michael V.
Anders Åneman, M.D.
Søren Boesgaard, M.D., D.M.S.
Jan Frederik Bugge, M.D.
Nicole P. Juffermans, M.D.
Lars Køber, M.D., D.M.Sci.
Jacob Eifer Møller, M.D.
Christian Rylander, M.D., Ph.D.
Per Winkel, M.D., D.M.Sci.
for the

ORIGINAL ARTICLE

Therapeutic Hypothermia after Out-of-Hospital Cardiac Arrest in Children

Frank W. Moler, M.D., Faye S. Silverstein, M.D., Richard Holubkov, Ph.D.,
Beth S. Slomine, Ph.D., Rasmus R. Christensen, M.D., Vinay M. Nadkarni, M.D.,
Kathleen L. ... Mark, M.S., Brittan Browning, M.S., R.D., C.C.R.C.,
... Kent Page, M.Stat., Seetha Shankaran, M.D.,
Jamie S. Hutchins, M.D., ... M.D., Kimberly S. Bennett, M.D., M.P.H.,
John T. Berger, M.D., ... Jose A. Pineda, M.D., Joshua D. Koch, M.D.,
Charles L. Schleien, M.D., ... M.D., George Ofori-Amanfo, M.B., Ch.B.,
Denise M. Goodman, M.D., ... Patrick McQuillen, M.D.,
Jerry J. Zimmerman, M.D., Ph.D., Neel ... Elise W. van der Jagt, M.D., M.P.H.,
Melissa B. Porter, M.D., Michael T. ... Harrison, M.D., Nga Pham, M.D.,
Adam J. Schwarz, M.D., Jeffrey E. Nowak, M.D., ... M.D., Derek S. Wheeler, M.D.,
Utpal S. Bhalala, M.D., Karen Lidsky, M.D., Eric ... Mudit Mathur, M.D.,
Samir Shah, M.D., Theodore Wu, M.D., Andreas A. ... rou, M.D.,
Ronald C. Sanders, Jr., M.D., and J. Michael Dean, M.D., M.B.A.,
for the THAPCA Trial Investigators*

ORIGINAL ARTICLE

Targeted Temperature Management at 33°C versus 36°C after Cardiac Arrest

Niklas Nielsen, M.D., Ph.D., Jørn Wetterslev, M.D., Ph.D., Tobias Cronberg, M.D., Ph.D.,

Table 2. Outcomes.

Outcome	33°C Group no./total no. (%)	36°C Group no./total no. (%)	Hazard Ratio or Risk Ratio (95% CI)*	P Value
Primary outcome: deaths at end of trial	235/473 (50)	225/466 (48)	1.06 (0.89–1.28)	0.51
Secondary outcomes				
Neurologic function at follow-up†				
CPC of 3–5	251/469 (54)	242/464 (52)	1.02 (0.88–1.16)	0.78
Modified Rankin scale score of 4–6	245/469 (52)	239/464 (52)	1.01 (0.89–1.11)	0.87
Deaths at 180 days	226/473 (48)	220/466 (47)	1.01 (0.87–1.15)	0.92

ELSEVIER

Contents lists available at [ScienceDirect](http://www.sciencedirect.com)

Resuscitation

journal homepage: www.elsevier.com/locate/resuscitation

Letter to the Editor

Prehospital therapeutic hypothermia after cardiac arrest: Is it really cool to stop?

Anatolij Truhlar^{a,b,*,1}
Roman Skulec^{b,c,2}
Vladimir Cerny^{b,d,3}

* Corresponding author. Emergency Medical Services of the Hradec Kralove Region, Hradecka 1690/2A, 500 12 Hradec Kralove, Czech Republic.

~~Hypothermie Thérapeutique Modérée en post-AC en 2010~~

« Contrôle Ciblé de la Température » en post-AC en 2015

- Température entre 32 et 36° C pendant au moins 24h
- Pour tous les AC : rythme choquable et non choquable
- Prévention de l'apparition d'une fièvre +++
- Eviter le remplissage par du sérum salé froid en préhospit.

Normo-oxygénation en post-AC

• Cohorte multicentrique

Association Between Arterial Hyperoxia Following Resuscitation From Cardiac Arrest and In-Hospital

• 120

• 6326

• GDS

• 3 gr

- Hyper

- Norm

- Hypo

-> Mo

v

Adult Immediate Post-Cardiac Arrest Care

et al.

Doses/Details

Ventilation/Oxygenation

Avoid excessive ventilation. Start at 10-12 breaths/min and titrate to target PETCO₂ of 35-40 mm Hg.

When feasible, titrate FIO₂ to minimum necessary to achieve SpO₂ ≥94%.

IV Bolus

1-2 L normal saline or lactated Ringer's. If inducing hypothermia, may use 4°C fluid.

Epinephrine IV Infusion:

0.1-0.5 mcg/kg per minute (in 70-kg adult: 7-35 mcg per minute)

001

28

83

70

& Hypoxie = 57%

Hyperoxia: 1100 400 211 110

Régulation des patients en post-AC

- Admission dans un service de réanimation spécialisé
- Plateau technique adapté :
 - Angioplastie 24/24
 - Hémodilution
 - Hypothermie contrôlée invasive
 - Assistance circulatoire si nécessaire
 -

- > **Équipes de SAMU / SMUR, de réanimation et de cardiologie motivées !**
- > **Centres spécialisés pour la PEC des Arrêts Cardiaques**

Assistance circulatoire : ECMO

- Une assistance circulatoire peut être indiquée en cas d'AC réfractaire intra-hospitalier ou extra-hospitalier d'origine cardiaque potentiellement réversible

Assistance circulatoire : ECMO

- Une assistance circulatoire peut être indiquée en cas d'AC réfractaire intra-hospitalier ou extra-hospitalier d'origine cardiaque potentiellement réversible
 - No Flow $\leq$ 5min
 - Facteurs de protection cérébrale
 - Hypothermie
 - Intoxication mdc
 - Anesth. générale

Evaluation du pronostic neurologique

Don d'organe : DDAC

**ACR
Réfractaire**

**Stop RCP
= Décès**

**CEC
Thérapeutique**

**Prélèvement à
Cœur Arrêté**

Don d'organe : Mort encéphalique

- Prélèvement multi-organe possible si mort encéphalique
 - A cœur battant $\pm$ ECLS = ME conventionnelle
 - A cœur non battant sous assistance circulatoire totale
 - Véritable PMO pouvant inclure cœur et poumons (> DDAC)

Extracorporeal Life Support in a Case of Fatal Flecainide and Betaxolol Poisoning Allowing Successful Cardiac Allograft

Benoît Vivien, MD, PhD, Nicolas Deye, MD, Bruno Mégarbane, MD, PhD, Jean-Sébastien Marx, MD, Pascal Leprince, MD, PhD, Nicolas Bonnet, MD, France Roussin, RN, Laurent Jacob, MD, Alain Pavie, MD, PhD, Frédéric J. Baud, MD, PhD, Pierre Carli, MD

From the Service d'Aide Médicale Urgente de Paris, Département d'Anesthésie-Réanimation, Hôpital Necker Enfants Malades, Paris, France (Vivien, Marx, Carli); the Service de Chirurgie Cardiaque, Groupe Hospitalier Pitié-Salpêtrière, Paris, France (Leprince, Bonnet, Pavie); the Service de Réanimation Médicale & Toxicologique, Hôpital Lariboisière, Paris, France (Deye, Mégarbane, Baud); and the Coordination des Prélèvements d'Organes (Roussin) and the Service de Réanimation Chirurgicale (Jacob), Hôpital Saint Louis, Paris, France.

Conclusion

- **Continuité des recommandations internationales**
 - pas de changement fondamental ou de nouveauté révolutionnaire
 - adaptations de gestes techniques et/ou thérapeutiques
- **3 grands messages :**
 - 1) Fréquence du MCE = 100 à 120 / min
 - 2) Adrénaline = seul vasoconstricteur recommandé
 - 3) Contrôle ciblé de la température 32 à 36° C pour tous les AC
- **Fin des recommandations quinquennales**
 - mises à jour et publications régulières on line

Merci de votre attention