Evolution de la PEC des patients COVID+ et soins intensifs au cours des différentes vagues en réanimation

A.BORGES - A.FREYNET-
A.LAGRUE- T.REGINAULT
CHU BORDEAUX

- ▶ **Pic de la première vague** : entre le 6 et le 10 avril 2020
- ▶ **Pic de la deuxième vague** : entre le 12 et le 19 novembre 2020
- ▶ **Pic de la troisième vague** : estimé le 12 avril 2021 pour les hospitalisations et le 13 avril pour les réanimations.
- ▶ **Pic de la quatrième vague** : estimé à la mi-août 2021.

Propagation du SARS Cov 2 en France

- 22/01/2020: 1^{er} patient français et européen COVID + hospitalisé à Pellegrin en Réa Med (français d'origine chinoise qui avait séjourné à Wuhan)
- 09/02/2020: 1^{er} foyer aux contaminés Montjoie (5 britanniques dont 1 enfant qui avait fréquenté des établissements scolaires)
- 15/02/2020: 2^e cluster sur base militaire dans l'oise suite aux rapatriement de 180 français de Wuhan)
- 25/02/2020: 1^{er} décès en France d'un enseignant tjrs dans l'oise
- 02/03/2020: 1ers cas positifs suite au rassemblement de 2500 fidèles de l'église évangélique à Mulhouse
- 12/03: fermetures crèches/écoles/...
- ... 17/03/2020: confinement

1^{er} Pic: à Bordeaux

- Peu de cas bordelais...
- Organisation des services de réa pour la réception des COVID+
- des transferts de l'Est issu du rassemblement de l'église évangélique
- Préparation: respirateur en montage covid; fabrication de billard pour le DV, réflexion autour de l'extubation
- PECi: mob passive; ECBC; extubations
- 1^{ère} extubation d'un COVID+: 20/03/2020

GAVO2- Mars 2020

PROCEDURE EXTUBATION COVID-19 (SARS-CoV-2)

Matériel : seringue 10ml ; ciseaux ; lunettes O2 +/- masque VNI +/- système OHD; masque chirurgical ; absorbant

1. Expliquer le geste au patient et l'assoir
2. MEP lunettes O2 (attachées à l'arrière de l'occiput et débit ouvert), champs absorbant sur le thorax, seringue sur la valve du ballonnet et masque chirurgical attaché qu'au niveau du cou (lanières du bas)
3. KR + Basp + aspiration buccale
4. Ablation SNG si buccale
5. Découpe de la lie+ arrêt du respirateur +dégonflage du ballonnet + aspiration buccale
6. extraction de la SI dans le champ absorbant puis emballer le tout
7. Attacher immédiatement et complètement le masque chirurgical
8. Surveillance respiratoire, KR +/- aspiration buccale
9. Application du masque de VNI / système d'OHD si indication

Recommandations SKR dès la première vague

Recommandations sur la prise en charge kinésithérapique **des patients COVID-19 en réanimation**

Version 1 du 19/03/2020

Conseil Scientifique de la Société de kinésithérapie de Réanimation : Pierre Maffei (Marseille), Marie-Hélène Houzé (Paris), Anne Freynet (Bordeaux), Ingrid Koube (Bruxelles), Cheryl Hickmann (Bruxelles), Aldjia Abdellaoui (Montpellier), Pauline Wild (Pontoise), Jean Christophe Villiot-Danger (Briançon), Roberto Martinez-Alejos (Montpellier), Muriel Lemaire (Bruxelles), Matthieu Reffienna (Suresnes)

Avec le soutien du Collège National de la Kinésithérapie Salariée

Spécificités G4 Pneumo Magendie

Patients sortants de réa

Patients non-réanimatoires

DV vigiles

Aide au transport patients (Monnal)

Aspects respi (O2/Cpap)

Aspects réhabilitation +++

- Protocole DV
vigile

- Rapprocher le coussin serpent le plus près possible du patient.
- Si le patient en est capable, côté opposé au retournement, lui faire plier la jambe.
- Tourner le patient.
- La tête doit reposer sur le coussin serpent. Veiller à ce qu'il n'y ait aucune douleur au niveau de la lie des lunettes Optiflow (ou du masque de VNI).
- Le tronc repose en partie sur le coussin serpent.
- Dégager le bras supérieur vers l'avant et le positionner sur le coussin blanc.
- Le coussin serpent doit passer entre les 2 jambes et la jambe supérieure doit être fléchie (position «nage indienne»).
- Vérifier la saturation en oxygène.
- Couvrir le patient.

Evolution de la PEC

Nouveaux défis

Pilier

Equipe multidisciplinaire reconstituée;
Référénts du matériel de ventilation;

Spécifique:

Paramétrage de la VNI;
Choix de l'interface;
Réajustement des respirateurs;
Installation des patients;
Education des patients

Général:

Un soignant de plus;
Aide aux mobilisations;
RASSURER les patients

Rôle du kinésithérapeute

*L'essentiel est **invisible** pour les yeux*

Antoine Saint-Exupéry

Covid-19: Retour d'expérience au CHU de Martinique

Axel LAGRUE
Masseur-kinésithérapeute
19 - 11 - 2021

Point de situation hebdomadaire (ARS)

Sources : Bed management au 13/09 à 22h00

VACCINATION

> Nombre de personnes ayant un schéma vaccinal complet (1^{ère} et 2^{ème} injections) : **88 153** (29,4 % pop. 12 ans et plus).

Proportion population partiellement vaccinée

Proportion de la population ayant reçu au moins une dose de vaccin au 15/11

CovidTracker.fr - Données : Santé publique France

Taux d'incidence

Nombre de cas cette semaine pour 100k habitants au 14/07

Taux d'incidence Covid-19 Martinique

Suivi de répartition des âges

SUIVI DE LA RÉPARTITION DES AGES DES PATIENTS COVID HOSPITALISÉS
(TOUS SERVICES)

SUIVI DE LA RÉPARTITION DES AGES DES PATIENTS COVID EN RÉANIMATION

Rôles du renfort-kiné en réanimation au CHUM :

- se mettre au service des collègues sur place
- Participer au sevrage ventilatoire/sevrage de l'oxygène
- Participer aux changements de position/installation optimale. DV vigile
- Evaluer les patients +++
- Réhabilitation précoce

FRANCE-ANTILLES

Le bâtiment de soutien et d'assistance outre-mer Dumont d'Urville a appareillé hier soir en direction de la Martinique avec à son bord plus de 100 tonnes d'oxygène.

Le bâtiment de soutien et d'assistance outre-mer Dumont d'Urville de la Marine nationale a débuté le 11 août une mission de transport d'oxygène entre la Guyane et la Martinique. Basé aux Antilles, le Dumont d'Urville a atteint le 14 août le port de Degrad des Cannes en Guyane pour y faire remplir d'oxygène trois containers qu'il a transportés. Ces containers seront déchargés à Fort-de-France, ce jeudi 19 août pour être mis à disposition de l'Agence régionale de santé. Une deuxième rotation du navire est d'ores et déjà prévue. Cette livraison répond à une demande de concours exprimée par la préfecture de la zone de défense et de sécurité Antilles.

Rappelons que la quantité d'oxygène consommée par le CHU a augmenté de façon exponentielle depuis le début de cette quatrième vague. « Face à cela, les

Merci de votre attention