Monitoring Hémodynamique non-invasif au bloc opératoire aujourd'hui

Marie-Evelyne Hamant (IADE) et Pr Matthieu Biais (MAR)

Pôle Anesthésie et de Réanimation - CHU de Bordeaux

**What type of monitoring has been shown
to improve outcomes in acutely ill patients?**

What type of monitoring has been shown to improve outcomes in acutely ill patients?

- PVC : NS sur la mortalité
- CAP: 16 études : 14/16 : NS
- EPEV : NS
- DTO / ETO : mortalité non étudiée
- SvO₂ : 6 études : 2 positives et 4 negatives
- SpO₂: 7 études : NS mortalité

Monitoring Hémodynamique ?

L'utilisation seule d'un outil ne va pas changer le pronostic

« Aucun appareil de surveillance ne va améliorer le devenir des patients SAUF si il est couplé à un traitement spécifique »

Pinsky,M and Vincent, J.L Crit Care Med 2005

Monitoring Hémodynamique non-invasif au bloc opératoire aujourd'hui

Pression Artérielle

Indices Dynamiques

Débit Cardiaque

Monitoring Hémodynamique non-invasif au bloc opératoire aujourd'hui

Pression Artérielle

Impact de l'hypotension artérielle

Association entre hypotension artérielle per-opératoire et morbidité post-opératoire

Incidence and predictors of major perioperative adverse cardiac and cerebrovascular events in non-cardiac surgery

The association of hypotension during non-cardiac surgery, before and after skin incision, with postoperative acute kidney injury: a retrospective cohort analysis

, N. Guilera³, J. Canet⁴, J. Castillo⁵, C. Orrego⁶, A. Sabaté⁷, G. Fita⁸, F. Parramón¹⁰,
guez³ and M. Sabaté⁹, on behalf of the ANESCARDIOCAT Group[†]

Period-dependent Associations between Hypotension during and for Four Days after Noncardiac Surgery and a Composite of Myocardial Infarction and Death

A Substudy of the POISE-2 Trial

Perioperative Mean Arterial Pressure after Noncardiac Surgery

Association of Hypotension

Impact de l'hypotension artérielle

IRA
EER

Ischémie
MINS

AVC
Delirium

Sepsis
SIRS

Décès

Impact de l'hypotension artérielle

IRA
EER

Ischémie
MINS

AVC
Delirium

Sepsis
SIRS

Décès

Quelque soient

Durée de l'hypotension artérielle

Cause de l'hypotension artérielle

Moment de survenue

Débit cardiaque

Relationship between Intraoperative Mean Arterial Pressure and Clinical Outcomes after Noncardiac Surgery

Toward an Empirical Definition of Hypotension

33,330 patients, chirurgie non cardiaque (Cleveland, Ohio)

Impact de l'hypotension artérielle

IRA
EER

Ischémie
MINS

AVC
Delirium

Sepsis
SIRS

Décès

Quelque soient

Durée de l'hypotension artérielle

Cause de l'hypotension artérielle

Moment de survenue

Débit cardiaque

The association of hypotension during non-cardiac surgery, before and after skin incision, with postoperative acute kidney injury: a retrospective cohort analysis

42825 patients, chirurgie non cardiaque
 Relation hTA avant ou après incision et IRA

Duration of MAP < 65 mmHg

Before incision
 After incision
 Total

Odds ratio (95% CI)

1.04 (1.01–1.07)
 1.03 (1.00–1.05)
 1.05 (1.02–1.07)

AUC of MAP < 65 mmHg

Before incision
 After incision
 Total

1.02 (1.01–1.04)
 1.02 (1.00–1.04)
 1.03 (1.02–1.05)

**Augmentation du risque d'IRA quelque soit
 l'origine de l'hypotension artérielle**

Impact de l'hypotension artérielle

IRA
EER

Ischémie
MINS

AVC
Delirium

Sepsis
SIRS

Décès

Quelque soient

Durée de l'hypotension artérielle

Cause de l'hypotension artérielle

Moment de survenue

Débit cardiaque

Period-dependent Associations between Hypotension during and for Four Days after Noncardiac Surgery and a Composite of Myocardial Infarction and Death

A Substudy of the POISE-2 Trial

9765 patients, étude ancillaire POISE2

Association hypotension artérielle et morbidité

Hypotension post-opératoire : J0 et J1-J4

Hypotension artérielle per et postopératoire augmente les complications cardiaques postopératoires

Impact de l'hypotension artérielle

IRA
EER

Ischémie
MINS

AVC
Delirium

Sepsis
SIRS

Décès

Quelque soient

Durée de l'hypotension artérielle

Cause de l'hypotension artérielle

Moment de survenue

Débit cardiaque

Association between intraoperative mean arterial pressure and postoperative complications is independent of cardiac index in patients undergoing noncardiac surgery

790 patients, chirurgie non cardiaque, monitoring PAM et IC
Comparaison du % de complications en fonction des groupes PAM et DC optimaux ou non

Effect of Individualized vs Standard Blood Pressure Management Strategies on Postoperative Organ Dysfunction Among High-Risk Patients Undergoing Major Surgery
A Randomized Clinical Trial

Essai randomisé
300 patients randomisés
80% d'HTA
95% de chirurgie abdominale

Groupe contrôle
Maximalisation VES
PAS = 80 mmHg

Groupe Interventionnel
Maximalisation VES
PAS = +/-10% valeur basale de
PAS : NORADRENALINE

**Effect of Individualized vs Standard Blood Pressure Management Strategies on Postoperative Organ Dysfunction Among High-Risk Patients Undergoing Major Surgery
A Randomized Clinical Trial**

Diminution des complications postopératoires

Monitoring non-invasif de la pression artérielle

BRASSARDS
Mesures Intermittentes

Invasive and Concomitant Noninvasive Intraoperative Blood Pressure Monitoring

Observed Differences in Measurements and Associated Therapeutic Interventions

vs.

24225 patients, chirurgie non cardiaque
Comparaison PA invasive et brassard

Pressions basses : brassard sur estime la mesure invasive

Pressions hautes : brassard sous-estime la mesure invasive

Noninvasive monitoring of blood pressure in the critically ill: Reliability according to the cuff site (arm, thigh, or ankle)*

150 patients, Réanimation

Comparaisons Mesures invasives et non-invasives: bras, cuisse, cheville

Noninvasive monitoring of blood pressure in the critically ill: Reliability according to the cuff site (arm, thigh, or ankle)*

150 patients, Réanimation

Comparaisons Mesures invasives et non-invasives: bras, cuisse, cheville

Capacité des mesures non-invasives à identifier
une PAM < 65 mmHg

Noninvasive monitoring of blood pressure in the critically ill: Reliability according to the cuff site (arm, thigh, or ankle)*

150 patients, Réanimation

Comparaisons Mesures invasives et non-invasives: bras, cuisse, cheville

Capacité des mesures non-invasives à identifier une PAM < 65 mmHg

	Cutoff of 65 mm Hg for Noninvasive Mean Arterial Pressure				
	Area Under the Receiver Operating Characteristic Curve	Sensitivity, %	Specificity, %	Positive Likelihood Ratio	Negative Likelihood Ratio
Arm (n = 83)	0.98 [0.92–1]	95 [83–99]	95 [84–99]	20 [18–22]	0.05 [0.01–0.4]
Ankle (n = 83)	0.93 [0.85–0.97]	90 [76–97]	81 [67–92]	4.8 [4.0–5.8]	0.13 [0.04–0.4]
Thigh (n = 74)	0.93 [0.85–0.98]	97 [85–100]	74 [57–87]	3.7 [3.0–4.5]	0.04 [0.005–0.3]

The analysis was based on the mean of three consecutive measurements with each technique.

Mesure au bras est fiable à la phase initiale

Noninvasive monitoring of blood pressure in the critically ill: Reliability according to the cuff site (arm, thigh, or ankle)*

150 patients, Réanimation

Comparaisons Mesures invasives et non-invasives: bras, cuisse, cheville

Capacité à identifier
une variation de 10% de la PAM

Noninvasive monitoring of blood pressure in the critically ill: Reliability according to the cuff site (arm, thigh, or ankle)*

150 patients, Réanimation

Comparaisons Mesures invasives et non-invasives: bras, cuisse, cheville

Capacité à identifier
une variation de 10% de la PAM

	Cutoff of 10% for Changes in noninvasive Mean Arterial Pressure				
	Area Under the Receiver Operating Characteristic Curve	Sensitivity, %	Specificity, %	Positive Likelihood Ratio	Negative Likelihood Ratio
Arm (n = 57)	0.99 [0.92–1]	91 [76–98]	96 [79–100]	22 [19–25]	0.09 [0.01–0.9]
Ankle (n = 57)	0.90 [0.80–0.97]	83 [67–94]	86 [64–97]	5.8 [4.6–7.3]	0.19 [0.05–0.7]
Thigh (n = 52)	0.96 [0.87–0.99]	76 [58–89]	90 [67–99]	7.2 [5.6–9.2]	0.27 [0.06–1.1]

Mesure au bras est fiable à la phase initiale

Monitoring non-invasif de la pression artérielle

BRASSARDS

Mesures Intermittentes

MANCHETTES DIGITALES

Mesures Continues
Non-Invasif

Méthode du Volume-Clamp

- Manchette digitale avec **diode électroluminescente** émettrice et réceptrice
- Mesure continue diamètre artères digitales palmaires (pléthysmographie)
- Variation de pression dans la manchette (gonflage et dégonflage) pour maintenir un diamètre artériel constant tout au long du cycle cardiaque
- Pression générée de la manchette = pression intra-artérielle digitale (temps réel)

Recommendations

Bias should be ≤ 5 mmHg with a SD ≤ 8 mmHg according to the ANSI/AAMI standards

Accuracy and Precision of Continuous Noninvasive Arterial Pressure Monitoring Compared with Invasive Arterial Pressure

A Systematic Review and Meta-analysis

Accuracy and Precision of Continuous Noninvasive Arterial Pressure Monitoring Compared with Invasive Arterial Pressure

A Systematic Review and Meta-analysis

What This Article Tells Us That Is New

- This meta-analysis found that accuracy and precision of continuous noninvasive arterial pressure monitoring devices are larger than what was defined as acceptable by the Association for the Advancement of Medical Instrumentation.

Continuous noninvasive pulse wave analysis using finger cuff technologies for arterial blood pressure and cardiac output monitoring in perioperative and intensive care medicine: a systematic review and meta-analysis

PAM

PAS

PAD

**Résultats corrects
pour PAS/PAM**

A Randomized Trial of Continuous Noninvasive Blood Pressure Monitoring During Noncardiac Surgery

320 patients >45 ans, risque intermédiaire ou élevé

Groupe contrôle: Monitoring discontinu (brassard)

Groupe interventionnel: continu non invasif

Objectif : PAM > 65 mmHg

CJP: temps passé au dessous de 65 mmHg

A Randomized Trial of Continuous Noninvasive Blood Pressure Monitoring During Noncardiac Surgery

320 patients >45 ans, risque intermédiaire ou élevé

Groupe contrôle: Monitoring discontinu (brassard)

Groupe interventionnel: continu non invasif

Objectif : PAM > 65 mmHg

CJP: temps passé au dessous de 65 mmHg

**Diminution significative de
la durée cumulée
d'hypotension artérielle**

Monitoring Hémodynamique non-invasif au bloc opératoire aujourd'hui

Pression Artérielle

Indices Dynamiques

Indices Dynamiques

Indices Dynamiques

Faire Varier la précharge

Monitorer le VES ou un dérivé

Localiser le patient sur la courbe de FS

Indices Dynamiques

Indices Dynamiques

Indices Dynamiques

Ventilation Mécanique

Indices Dynamiques

Ventilation Mécanique

Variations
respiratoires

Indices Dynamiques

Ventilation Mécanique

Variations
respiratoires

DeltaPP
VVE
PVI

Indices Dynamiques

Ventilation Mécanique

Variations
respiratoires

Manœuvres
respiratoires

DeltaPP
VVE
PVI

Indices Dynamiques

Ventilation Mécanique

Variations
respiratoires

Manœuvres
respiratoires

DeltaPP
VVE
PVI

Pause téléexpiratoire
Recrutement alvéolaire
Augmentation Vt

Indices Dynamiques

Ventilation Mécanique

Positionnement

Variations
respiratoires

Manœuvres
respiratoires

Lever de jambes

DeltaPP
VVE
PVI

Pause téléexpiratoire
Recrutement alvéolaire
Augmentation Vt

Indices Dynamiques

Ventilation Mécanique

Positionnement

MiniFluid

Variations
respiratoires

Manœuvres
respiratoires

Lever de jambes

DeltaPP
VVE
PVI

Pause téléexpiratoire
Recrutement alvéolaire
Augmentation Vt

Indices Dynamiques

Ventilation Mécanique

Positionnement

MiniFluid

Variations
respiratoires

Manœuvres
respiratoires

Lever de jambes

TRES PEU DE DONNEES AVEC
LE NON INVASIF +++

DeltaPP
VVE
PVI

Pause téléexpiratoire
Recrutement alvéolaire
Augmentation Vt

Evaluation of pulse pressure variation validity criteria in critically ill patients: a prospective observational multicentre point-prevalence study[†]

Total $n=311$ (100%)

Evaluation of pulse pressure variation validity criteria in critically ill patients: a prospective observational multicentre point-prevalence study[†]

Total $n=311$ (100%)

PPV utilisable
chez 4% des
patients ventilés

Monitoring Hémodynamique non-invasif au bloc opératoire aujourd'hui

Pression Artérielle

Indices Dynamiques

Débit Cardiaque

Monitoring Hémodynamique non-invasif au bloc opératoire aujourd'hui

Pression Artérielle

Indices Dynamiques

Débit Cardiaque

1. POURQUOI MONITORER LE DEBIT CARDIAQUE ?

Le monitoring de la pression artérielle n'est-il pas suffisant ?

Arterial pressure allows monitoring the changes in cardiac output induced by volume expansion but not by norepinephrine*

228 patients: expansion volémique

145 patients : introduction / augmentation NAD

Arterial pressure allows monitoring the changes in cardiac output induced by volume expansion but not by norepinephrine*

228 patients: expansion volémique

145 patients : introduction / augmentation NAD

Remplissage Vasculaire
(n=228)

Arterial pressure allows monitoring the changes in cardiac output induced by volume expansion but not by norepinephrine*

228 patients: expansion volémique

145 patients : introduction / augmentation NAD

Remplissage Vasculaire
(n=228)

Introduction ou ↑ NAD
(n=145)

Pourquoi Monitorer le Débit Cardiaque ?

La Pression Artérielle ne suffit-elle pas ?

NON

Il faut mesurer le débit cardiaque car les variations de pression artérielle ne reflètent pas les variations de débit cardiaque

La mesure de la pression artérielle est-elle
suffisante ?

La pression artérielle est régulée

**Une pression artérielle normale n'exclue pas
un débit cardiaque insuffisant**

Stratégie du remplissage vasculaire périopératoire[☆]

Guidelines for perioperative haemodynamic optimization

Recommandation I

Chez les patients chirurgicaux considérés « à haut risque », il est recommandé de titrer le remplissage vasculaire peropératoire en se guidant sur une mesure du volume d'éjection systolique (VES) dans le but de réduire la morbidité postopératoire, la durée de séjour hospitalier, et le délai de reprise d'une alimentation orale des patients de chirurgie digestive. **GRADE I+.**

Pourquoi monitorer le débit cardiaque ?

Optimisation du DC/VES = MAXIMALISATION

Titration du remplissage pour maximaliser le VES

Protocole recommandé par la SFAR

Niveau de Preuve

META ANALYSES

- **Optimisation Hémodynamique diminuée:**

- **Insuffisance rénale aiguë**

Brienza et al. Crit Care Med 2009

- **Complications Gastro-intestinales**

Giglio et al. Br J Anaesth 2009

- **Infections Postopératoires (Pneumoathies, IU ...)**

Dalfino et al. Crit Care 2011

- **Morbidité et Mortalité**

Hamilton et al. Anesth Analg 2011

- **Morbidité et Durée de séjour**

Pearse et al. JAMA 2014

Monitoring Hémodynamique non-invasif au bloc opératoire aujourd'hui

Pression Artérielle

Indices Dynamiques

Débit Cardiaque

1. POURQUOI MONITORER LE DEBIT CARDIAQUE ?
2. LE MONITORAGE NON INVASIF EST-IL FIABLE ?

Monitoring non-invasif du débit cardiaque

Accuracy and precision of non-invasive cardiac output monitoring devices in perioperative medicine: a systematic review and meta-analysis[†]

Evaluation des dispositifs de monitoring non invasifs du débit cardiaque , 37 études

Temps de transit de l'onde de pouls

Réinhalation de CO2

Bioimpédance

Analyse contour onde de pouls

Biais élevés

Pourcentage d'erreur: 47% (>30%)

Etudes hétérogènes +++ ($I^2=83\%$)

Doppler Oesophagien

- **Avantages**

- Non invasive
- Valeur absolue estimée
- Capacité à détecter les variations de DC

Dark et al. Intensive Care Med 2004

- **Limites**

- Difficultés à garder un signal de bonne qualité
- Entraînement nécessaire

Lefrant et al. Intensive Care Med 1998

Monitoring Hémodynamique non-invasif au bloc opératoire aujourd'hui

Pression Artérielle

Débit Cardiaque

1. POURQUOI MONITORER LE DEBIT CARDIAQUE ?
2. LE MONITORAGE NON INVASIF EST-IL FIABLE ?
3. L'UTILISATION DE CE TYPE DE DISPOSITIF AMELIORE-T-IL LE DEVENIR DES PATIENTS ?

Goal-directed Intraoperative Fluid Administration Reduces Length of Hospital Stay after Major Surgery

Tong J. Gan, M.B., B.S, F.R.C.A., Andrew Soppitt, B.Sc., M.B., B.S., F.R.C.A.,† Mohamed Maroof, M.D.,‡
Habib El-Moalem, Ph.D.,§ Kerri M. Robertson, M.D.,* Eugene Moretti, M.D.,† Peter Dwane, M.D.,‡
Peter S. A. Glass, M.B., F.F.A. (S.A.)||*

Anesthesiology 2002; 97:820-6

100 patients, chirurgie majeure

Optimisation du VES par remplissage vasculaire

Diminution morbidité

Réduction durée de séjour

Perioperative non-invasive haemodynamic optimisation using photoplethysmography: A randomised controlled trial and meta-analysis

160 patients, chirurgie colo-rectale,

Bras contrôle: optimisation PAM 65 mmHg,
remplissage vasopresseurs

Bras interventionnel: idem + optimisation
VES par remplissage

CJP: complications à J30

Perioperative non-invasive haemodynamic optimisation using photoplethysmography: A randomised controlled trial and meta-analysis

160 patients, chirurgie colo-rectale,

Bras contrôle: optimisation PAM 65 mmHg,
remplissage vasopresseurs

Bras interventionnel: idem + optimisation
VES par remplissage

CJP: complications à J30

Complications	Control group (n = 34)	Interventional group (n = 40)	P
Infection source uncertain	3 (9)	5 (12)	0.719
Surgical site infection (superficial)	5 (15)	12 (30)	0.200
Surgical site infection (deep)	6 (18)	5 (12)	0.770
Surgical site infection organ/ space	3 (9)	3 (7)	1.000
Urinary tract infection	8 (23)	5 (15)	0.525
Bloodstream infection	4 (12)	0 (0)	0.040
Paralytic ileus	16 (47)	13 (32)	0.299
Anastomotic breakdown	1 (3)	3 (7)	0.620
Gastrointestinal bleed	4 (12)	6 (15)	0.745
Postoperative haemorrhage	5 (15)	3 (7)	0.458
Pneumonia	1 (3)	1 (2)	1.000
Pulmonary embolism	1 (3)	0 (0)	0.459
Respiratory failure	1 (3)	0 (0)	0.459
ARDS	0 (0)	0 (0)	1.000
Cardiogenic pulmonary oedema	0 (0)	0 (0)	1.000
Acute coronary syndrome	1 (3)	0 (0)	0.459
Myocardial infarction	1 (3)	0 (0)	0.459
Myocardial injury	1 (3)	0 (0)	0.459
Arrhythmia	1 (3)	1 (2)	1.000
Cardiac arrest	0 (0)	0 (0)	1.000
Stroke	0 (0)	0 (0)	1.000
Acute kidney injury (KDIGO 1 to 3)	1 (3)	3 (7)	0.620
Intensive care admission	2 (6)	0 (0)	0.208

Perioperative non-invasive haemodynamic optimisation using photoplethysmography: A randomised controlled trial and meta-analysis

160 patients, chirurgie colo-rectale,

Bras contrôle: optimisation PAM 65 mmHg, remplissage vasopresseurs

Bras interventionnel: idem + optimisation VES par remplissage

CJP: complications à J30

Complications	Control group (n = 34)	Interventional group (n = 40)	P
Infection source uncertain	3 (9)	5 (12)	0.719
Surgical site infection (superficial)	5 (15)	12 (30)	0.200
Surgical site infection (deep)	6 (18)	5 (12)	0.770
Surgical site infection organ/space	3 (9)	3 (7)	1.000
Urinary tract infection	8 (23)	5 (12)	0.525
Bloodstream infection	4 (12)	1 (2)	0.040
Paralytic ileus	1 (3)	0 (0)	0.299
Anastomotic breakdown	0 (0)	0 (0)	0.620
Gastrointestinal bleed	0 (0)	0 (0)	0.745
Postoperative haemorrhage	0 (0)	1 (2)	0.458
Pneumonia	0 (0)	1 (2)	1.000
Pulmonary embolism	0 (0)	0 (0)	0.459
Respiratory failure	0 (0)	0 (0)	0.459
ARDS	0 (0)	0 (0)	1.000
Cardiac arrest	0 (0)	0 (0)	1.000
Cardiac oedema	0 (0)	0 (0)	1.000
Acute coronary syndrome	1 (3)	0 (0)	0.459
Myocardial infarction	1 (3)	0 (0)	0.459
Myocardial ischaemia	1 (3)	0 (0)	0.459
Arrhythmia	1 (3)	1 (2)	1.000
Cardiac arrest	0 (0)	0 (0)	1.000
Stroke	0 (0)	0 (0)	1.000
Acute kidney injury (KDIGO 1 to 3)	1 (3)	3 (7)	0.620
Intensive care admission	2 (6)	0 (0)	0.208

Perioperative non-invasive haemodynamic optimisation using photoplethysmography: A randomised controlled trial and meta-analysis

Individualized Fluid Management Using the Pleth Variability Index

A Randomized Clinical Trial

$$PVi = \frac{Pi_{max} - Pi_{min}}{Pi_{max}} \times 100$$

Individualized Fluid Management Using the Pleth Variability Index

A Randomized Clinical Trial

447 patients, chirurgie orthopédique (PTH / PTG)
PAM 65 mmHg (contrôle) + PVI < 13% (interventionnel)
CJP: durée hospitalisation

Individualized Fluid Management Using the Pleth Variability Index

A Randomized Clinical Trial

447 patients, chirurgie orthopédique (PTH / PTG)
PAM 65 mmHg (contrôle) + PVI < 13% (interventionnel)
CJP: durée hospitalisation

Individualized Fluid Management Using the Pleth Variability Index

A Randomized Clinical Trial

447 patients, chirurgie orthopédique (PTH / PTG)
PAM 65 mmHg (contrôle) + PVI < 13% (interventionnel)
CJP: durée hospitalisation

TAKE HOME MESSAGES

- **Pression Artérielle**

- Relation hypotension artérielle ↔ morbidité

- **Indices Dynamiques**

- Beaucoup de limites au bloc opératoire
 - Peu de données avec le non invasif

- **Débit Cardiaque**

- Monitoring non invasif du débit cardiaque : valeur absolue peu fiable
 - Pas d'étude d'outcome positive sauf avec le doppler oesophagien

MERCI !!