[Copier le lien de participation](#)

1

Allez sur www.wooclap.com

2

Entrez le code d'événement dans le bandeau supérieur

Code
d'événement
JARCA

1

Envoyez **@JARCA** au **06 44 60 96 62**

2

Vous pouvez participer

La recherche infirmière au service de la prévention d'escarre

Olivier Toquin, IDE Aide au Cadre
Médecine Intensive Réanimation

Cécile Rougier, IDE Cadre de Santé
Equipe Mobile Plaies et Cicatrisation

CHU de Bordeaux
17 novembre 2022

17 NOVEMBRE 2022

**JOURNÉE MONDIALE DE LUTTE
CONTRE LES ESCARRES**

Tous Mobilisés !

En collaboration avec l'*Equipe*
Mobile Plaies et Cicatrisation nous
vous invitons à participer à un quiz

WOOCLAP - JARCA
#journée STOP ESCARRE

A vos smartphones...

[Copier le lien de participation](#)

- 1 Allez sur www.wooclap.com
- 2 Entrez le code d'événement dans le bandeau supérieur

Code
d'événement
JARCA

- 1 Envoyez **@JARCA** au **06 44 60 96 62**
- 2 Vous pouvez participer

Constat

Patient à risque ?

Protocole ?

Nutrition ?

Différentes pratiques

Support ?

Fréquence des
mobilisations ?

A vos smartphones...

[Copier le lien de participation](#)

- 1 Allez sur www.wooclap.com
- 2 Entrez le code d'événement dans le bandeau supérieur

Code
d'événement
JARCA

- 1 Envoyez **@JARCA** au **06 44 60 96 62**
- 2 Vous pouvez participer

Épidémiologie

- En 2017, d'après l'étude **PRESSURE** (SRLF)* :

18,7%

Prévalence

12,5%

Incidence

* Jacq G, Valera S, Muller G, Decormeille G, Youssoufa A, Poiroux L, et al. Prevalence of pressure injuries among critically ill patients and factors associated with their occurrence in the intensive care unit: The PRESSURE study. Aust Crit Care

Épidémiologie

Étude **PRESSURE** (SRLF) :

Formes graves
Stade 3-4

Sacrum

Épidémiologie

En 2019: au CHU de Bordeaux :

29%

Pôle d'Anesthésie-Réanimation
Service de Médecine Intensive Réanimation

Épidémiologie

En 2022: au CHU de Bordeaux

23%

Pôle d'Anesthésie-Réanimation

Prévalence en % des escarres 2022 par pôle

La relation est très significative, $p\text{-value} < 0,0$, Fisher = 3,7.
Variance inter = 573,9. Variance intra = 155,9.

Facteurs de risque

Complications

Événement indésirable associé aux soins (EIAS)

86,5% pendant l'hospitalisation*

- Douleur
- 45,9% infections nosocomiales*
- Qualité de vie du patient
- Impact psychologique patient / soignant

* Allman RM, Goode PS, Burst N, Bartolucci AA, Thomas DR. Pressure ulcers, hospital complications, and disease severity: impact on hospital costs and length of stay. Adv Wound Care J Prev Heal. févr 1999;12(1):22-30

Dépenses de Santé

« Les **coûts inhérents** à la prise en charge des escarres étaient au **troisième rang** après les cancers et les maladies cardiovasculaires. »*

En 2011, l'IRDES** estimait :

- + 5 612 €/patient
- + 11,2 jours DMS

* Gezondheidsraad. Health Council of the Netherlands: Pressure Ulcers. The Hague: Health Council of the Netherlands, 1999; publication no. 1999/23. Den Haag: Gezondheidsraad; 1999

** Nestrigue C, Or Z. Surcoût des événements indésirables associés aux soins à l'hôpital - Premières estimations à partir de neuf indicateurs de sécurité des patients. 2011

A vos smartphones...

[Copier le lien de participation](#)

- 1 Allez sur www.wooclap.com
- 2 Entrez le code d'événement dans le bandeau supérieur

Code
d'événement
JARCA

- 1 Envoyez **@JARCA** au **06 44 60 96 62**
- 2 Vous pouvez participer

Recommandations*

**Jugement
Clinique**

**Échelle de
Braden**

**Protocole de
prévention**

Avis d'expert

Grade 2+

**Groupe
réfèrent**

Formation

Nutrition

Grade 2+

Grade 2+

Grade 2+

Échelle de Braden

- recommandée par la HAS
- la **plus utilisée**
- dès l'**admission**
- **reproductible**
- **Sensibilité + / Spécificité -**

<i>Echelle de Braden</i>		
Perception sensorielle	Humidité	Activité
1 Absente	1 Constante	1 Alité
2 Très limitée	2 Très humide	2 Chaise
3 Légèrement limitée	3 Parfois humide	3 Marche rare
4 Non altérée	4 Rarement humide	4 Marche fréquente
Mobilité	Nutrition	Friction/cisaillements
1 Immobile	1 Très pauvre	1 Problème
2 Très limitée	2 Inadéquate	2 Problème potentiel
3 Légèrement limitée	3 Adéquate	3 Pas de problème
4 Non altérée	4 Excellente	

Patient à risque si score à 17
6 - 12 = risque très élevé
13 - 14 = risque modéré
15 - 16 = risque léger

Facteurs de risque propres à la réanimation non pris en compte

Facteurs de risque

Indice de Gravité Simplifié-2

- score **médical obligatoire**
- 24h après l'**admission**
- **non reproductible**
- plus il est élevé, plus la gravité est importante

Indice de Gravité Simplifié-2

“ L’IGS-2 PERMET-IL D’AMÉLIORER LA PRÉDICTION DU RISQUE D’ESCARRE CHEZ LES PATIENTS EN MÉDECINE INTENSIVE ET RÉANIMATION ADULTE ? ”

Méthode

- CINAHL; PubMed; Science Direct
- depuis 2017
- services de Médecine Intensive et de Réanimation médicales ou polyvalentes adultes

Diagramme de flux

Résultats

the **PRESSURE** study*

- Étude de prévalence
- En France, sur une journée (juin 2017)
- 86 établissements ; **1228 patients**
- Échelle de Braden **sous-optimale**
- **IGS-2 associé à l'acquisition d'escarre**

* Jacq G, Valera S, Muller G, Decormeille G, Yousseoufa A, Poiroux L, et al. Prevalence of pressure injuries among critically ill patients and factors associated with their occurrence in the intensive care unit: The PRESSURE study. Aust Crit Care. 20 janv 2021

Résultats

the DecubiCUs study*

- Étude internationale (90 pays)
- Prospective sur une journée (mai 2018)
- 1 117 ICU ; **13 254 patients**
- **Prévalence mondiale de 26,6%**
- Échelle de Braden **sous-optimale**
- **IGS-2 associé à l'acquisition d'escarre**

* Labeau SO, Afonso E, Benbenishty J, Blackwood B, Boulanger C, Brett SJ, et al. Prevalence, associated factors and outcomes of pressure injuries in adult intensive care unit patients: the DecubiCUs study. *Intensive Care Med.* 1 févr 2021;47(2):160-9

Intensive Care Med (2021) 47:160–169
<https://doi.org/10.1007/s00134-020-06234-9>

ORIGINAL

Prevalence, associated factors and outcomes of pressure injuries in adult intensive care unit patients: the DecubiCUs study

Sonia O. Labeau^{1,2}, Elsa Afonso^{2,3}, Julie Benbenishty⁴, Bronagh Blackwood⁵, Carole Boulanger⁶, Stephen J. Brett⁷, Silvia Calvino-Gunther⁸, Wendy Chaboyer⁹, Fiona Coyer^{11,12}, Mieke Deschepper¹³, Guy François¹⁴, Patrick M. Honore¹⁵, Radmilo Jankovic¹⁶, Ashish K. Khanna^{17,18}, Mireia Llauro-Serra¹⁹, Frances Lin^{9,10}, Louise Rose^{20,21,22,23}, Francesca Rubulotta⁷, Leif Saager^{24,25}, Ged Williams^{26,27}, Stijn I. Blot^{1,2}, on behalf of the DecubiCUs Study Team and the European Society of Intensive Care Medicine (ESICM) Trials Group Collaborators

© 2020 The Author(s), corrected publication 2020

Conclusion

Université de BORDEAUX

JE RECHERCHE

L'IGS-2 PERMET-IL D'AMÉLIORER LA PRÉDICTION DU RISQUE D'ESCARRE CHEZ LES PATIENTS EN MÉDECINE INTENSIVE ET RÉANIMATION ADULTE ?

ARTICLE RÉALISÉ PAR :
OLIVIER TOGON
Infirmier, chef de
Cadre en service de
médecine intensive
et réanimation,
CHU de Bordeaux
olivier.togon@chu-
bordeaux.fr

L'auteur déclare
ne pas avoir
de liens d'intérêt

La réanimation médicale est une unité de soins critiques spécialisée dans le diagnostic et le traitement des pathologies sévères au stade aigu. Les personnes qui y sont admises présentent au moins une détérioration d'une fonction vitale nécessitant fréquemment le recours à la ventilation mécanique, à une sédation de courte ou de longue durée et à des traitements vasopresseurs¹. Cela rend cette population particulièrement sujette aux escarres, avec cinq fois plus de risque de développer des lésions cutanées que dans d'autres services^{2, 3}.

INTRODUCTION

L'escarre s'apparente à « une lésion cutanée d'origine ischémique liée à une compression des tissus mous entre un plan dur et les saillies osseuses », et naît de multiples facteurs intrinsèques (diapnoée) liés au patient ou extrinsèques (mécaniques) liés à l'environnement⁴. En réanimation, la gravité de l'état initial, l'âge, le poids, l'immobilité, l'altération du rapport perfusion/oxygénation, la mise en place de vasocostricteurs et la durée moyenne de séjour sont des facteurs prédictifs du risque d'escarre⁵. Une fois présente, elle « entraîne principalement douleur et infection⁶ ». En effet, 55% des patients porteurs d'escarre(s) font des infections nosocomiales, et 86,5 % des complications durant leur hospitalisation⁷.

COORDINATION :
VALÉRIE BERGER
DR, PH, D, cadre supérieur
de soins, coordinatrice
de recherche en soins,
CHU de Bordeaux, membre
du GICRI, maître
de conférences associé
temporaire, université
de Bordeaux
valerie.berger@chu-bordeaux.fr
CAROLINE SERRECLAY
Docteur en santé communautaire,
présidente de la recherche
en soins de soins
de Bordeaux
caroline.serreclay@chu-bordeaux.fr

de ressourçage⁸. Une étude américaine a évalué l'impact des escarres, lesquelles multiplieraient par 2,6 les coûts en matière de soins et doubleraient la durée d'hospitalisation⁹. En 2021, l'Institut de recherche et documentation en économie de la santé estimait à 11,2 jours l'augmentation de la durée moyenne de séjour et un surcoût de 565 euros par patient¹⁰. Dans ce contexte, l'équipe paramédicale doit mettre en place des moyens de surveillance et de prévention, ainsi que des protocoles de soins adaptés à la réanimation¹¹.

PROBLÉMATIQUE D'ÉVALUATION

Cependant, la difficulté majeure dans ces unités de soins réside dans la prédiction du patient à risque d'escarre. Les recommandations internationales conseillent « d'utiliser, en association avec le jugement clinique, un outil commun d'évaluation du risque dès le premier contact avec le patient¹² ». En France, cet outil est l'Échelle de Braden, approuvée depuis 2001 par l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation de la santé¹³. L'évaluation est réalisée dès l'admission du patient, puis de manière hebdomadaire et/ou à chaque modification d'une donnée ou de l'état cutané. Cette échelle comporte six sous-catégories cotées entre 1 et 4 points. Le score total s'établit entre 6 et 23. Plus celui-ci est bas, plus le patient est à risque. Un score inférieur ou égal à 12 représente un risque élevé d'acquisition d'escarre. Or, la majorité des personnes hospitalisées en réanimation est à risque élevé¹⁴. Par conséquent, dans de tels services, l'échelle de Braden devient un outil d'une valeur prédictive d'escarre moyenne¹⁵. Son utilisation paraît sous optimale pour identifier et prédire les personnes à risque dans cette population¹⁶. En effet, l'ensemble des facteurs de risque d'escarre

Merci pour votre écoute

17 NOVEMBRE 2022

**JOURNÉE MONDIALE DE LUTTE
CONTRE LES ESCARRES**

Tous Mobilisés !