Rencontres d'anesthésie Sanofi
16 juin 2018

RAAC(CROC) EN ORTHOPÉDIE

A propos d'un cas
Mr P. 61 ans

Dr J. Iserentant
Médecin anesthésiste CHCB

Les données individuelles peuvent varier

Conflits d'intérêt

Pas de conflit d'intérêt à déclarer

Je déclare recevoir des honoraires en tant que conférencier de la part de Sanofi

Définitions

- RAAC : Récupération améliorée après chirurgie
HAS 2016 : “approche de prise en charge globale du patient favorisant le rétablissement précoce de ses capacités après la chirurgie”
 - Raccroc :
Petit Robert 1972 : “coup heureux dû au hasard plus qu'à l'habilité”
- 2018 : au CHCB, pas de protocole de RAAC en orthopédie

Consultation de chirurgie

J - 32

- Coxarthrose droite évoluée --> PTH voie postérieure
- ATCD :
 - PUC droite
 - Surpoids
 - IDM
- “Protocole RAAC” :
 - Lever J0
 - Sortie J1 ou J2

Consultation d'anesthésie

- Obésité morbide : IMC 40
- 2006 IDM : stent CD
- 2007 TVP postop
- 2010 Insuffisance cardiaque / bronchites
 - > consultation cardio récente :
 - EE normale en 2016
 - FEVG conservée
- ECG : onde Q isolée

Consultation d'anesthésie (2)

J - 7

- TTT --> pas d'interruption
 - Aspirine
 - IEC
 - Beta-bloquant
 - Statine
- Bio
 - “Hb normale” --> 12,9 g/dL
 - Normale par ailleurs
- Protocole proposé
 - AG / IOT
 - Infiltration AL
 - “Surveillance coronarienne SSPI 24h”

VPA

- Arrivée à 17h la veille
- “Liquides clairs jusqu'à H-2”

Bloc

- Durée chirurgie : 1h16
- PTH sans ciment voie postérieure
- Saignement : 350 mL
- Exacyl
- 1 redon aspiratif

Bloc (2)

- AG : ISR --> Propofol / Sufentanil / Rocuronium
- Sévoflurane
- Céfazoline : 4g
- Infiltration Naropéine 2mg/mL : 60 mL
- Dexaméthasone : 8 mg
- Paracétamol / Tramadol / Kétoprofène
- Labilité tensionnelle : éphédrine / néosynéphrine

- Extubation sur table (TOF > 90%)

SSPI

- Arrivée : 15h12
- Douleur : 2/10, pas de titration
- Pas d'oxygène
- Pas de bilan
- ECG = ras
- Sortie : 16h58

Service de chirurgie J0

- Mis au fauteuil à 19h à la demande du chirurgien
- Boissons ok

Service de chirurgie J+1

- Kiné au lit
- Fauteuil prolongé
- Morphine débutée à 15h
- Bilan : Hb 11,9 g/dL

Service de chirurgie J+2

J +2

- Ablation redon
- Marche
- Sortie décalée
- Interrogatoire du patient :
 - “peur que ca ne soit pas solide”
 - “peur de la douleur”
 - “satisfait”
 - “heureusement que je ne sors pas aujourd'hui”

Sortie J+3

- Retour au domicile :
 - IDE au domicile
 - Kiné à 100 m
- Lettre de sortie :
 - Sédation de la douleur difficile sur la 1ère nuit puis nette amélioration
 - Belle radiographie de contrôle
 - Bon début de réhabilitation à la marche
 - Départ à J+3 au domicile où le patient effectuera sa rééducation
 - Sera revu dans un mois

Analyse

Analyse

- ✓ **Education** : information ≠ formation
- ✓ **Apport de glucides préop** : utile en orthopédie ?
- ✓ **Jeune non prolongé** : programmation prioritaire : ambu ou RAAC ?
- ✓ **Optimisation hémoglobine** : délai consultation anesthésie / protocole
- ✓ **Analgésie orale péop**

Analyse

- ✓ ALR : AG vs rachi ? Infiltration vs bloc ?
- ✓ Hypnotiques/Sédatifs courte durée : quid kétamine ? quid prémédication ?
- ✓ Normothermie
- ✓ Normovolémie : monitoring ?
- ✓ Antibiorophylaxie adaptée
- ✓ Diminution pertes sanguines : quid du redon ?

Analyse

- ✓ Analgésie multimodale
- ✓ Prévention NVPO
- ✓ Mobilisation précoce
- ✓ Reprise précoce de l'alimentation

Conclusion

- La bonne volonté et les bonnes pratiques ne suffisent pas

Conclusion

- La bonne volonté et les bonnes pratiques ne suffisent pas

Feature	Clinical pathway	ERAS
Evidence based	Yes	Yes
Purpose	Support decision-making in patient care	Provide multidisciplinary plan of care
Components and interventions	Often restricted	Global
Outcome criteria	Not defined	Defined
Variance/deviations	Not applicable	Documented and analysed by audit process

Conclusion (2)

- La bonne volonté et les bonnes pratiques ne suffisent pas
- Pluridisciplinaire, communication
- Implique l'administration et l'organisation
- Quelques questions :
 - Sélectionner les patients ? Lesquels ?
 - Exclure des patients comorbides ?
 - Objectif fast-tracking à tout prix ?