**Rencontres d'Anesthésie
Sanofi 2019**

Quelle anesthésie pour la thrombectomie ?

—
Louis Delamarre
MD. MSc

Conflits d'intérêt :

Aucun

PAS DE FORMULE MAGIQUE

SELECTIONNEZ LES BONS PATIENTS

L'AVC ischémique en 2019

PRINCIPES :

TIMING

UNITES CRITIQUES SPECIALISEES

THROMBECTOMIE

HOMEOSTASIE CEREBRALE

= ANESTH-REA

Modified Rankin Scale

Récupération 100% + Aucun symptôme	0
Récupération 100% + quelques symptômes	1
Handicap léger – quelques activités impossibles	2
Handicap modéré - besoin aide, marche seul	3
Handicap modéré/sévère – aide pour besoins corporels	4
Handicap sévère – aide constante	5
Décès	6

LES QUESTIONS :

Pourquoi l'AG est-elle néfaste ?

Pourquoi l'AG a toute sa place ?

Comment choisir la bonne stratégie ?

Quelle AG et quelle sédation ?

2010-2015 : L'AG est néfaste

The effect of anesthetic management during intra-arterial therapy for acute stroke in MR CLEAN

500 patients de l'étude MR CLEAN

Figure 2 Modified Rankin Scale (mRS) score at 90 days by intention-to-treat groups

Aucune recommandation ni données sur le management de l'AG

ORIGINAL RESEARCH

Conscious sedation versus general anaesthesia during mechanical thrombectomy for stroke: a propensity score analysis

Jennifer S McDonald,¹ Waleed Brinjikji,¹ Alejandro A Rabinstein,² Harry J Cloft,^{1,3} Giuseppe Lanzino,^{1,3} David F Kallmes^{1,3}

Rétrospectif
Score de propension 1014 patients

Aucune donnée anesthésique

Base de données nationale : expertises variables

Quels sont les biais de ces études ?

Etudes ancillaires d'études de neuro-radio

Rétrospectives

Population hétérogène : AVC VB, NIHSS...

Données anesth fiables ~ 0

Pourquoi l'AG est-elle néfaste?

TIME IS BRAIN

Reducing Door-to-Puncture Times for Intra-Arterial Stroke Therapy: A Pilot Quality Improvement Project

Brijesh P. Mehta, MD; Thabele M. Leslie-Mazwi, MD; Ronil V. Chandra, MBBS, FRANZCR; Donnie L. Bell, MD; Chung-Huan J. Sun, BS; Joshua A. Hirsch, MD; James D. Rabinov, MD; Natalia S. Rost, MD, MPH; Lee H. Schwamm, MD; Joshua N. Goldstein, MD; Wilton C. Levine, MD; Rishi Gupta, MD; Albert J. Yoo, MD

Figure 2. Comparison of IAT processes. Schematic highlighting delays to IAT for the sequential (A) and parallel (B) workflows. ED indicates emergency department; IAT, intra-arterial therapy; NIR, neurointerventional radiology; QI, quality improvement.

HEMODYNAMIQUE

A decrease in blood pressure is associated with unfavorable outcome in patients undergoing thrombectomy under general anesthesia

60 patients sous AG

Cohorte MR CLEAN

Δ MAP (mmHg)

Fonctionnel mRS à 3 mois

**Even Small Decreases in Blood Pressure during Conscious Sedation Affect Clinical Outcome after Stroke Thrombectomy:
An Analysis of Hemodynamic Thresholds**

Chaque baisse de PAM de 10 mmHg en dessous de 100 mmHg =

risque de mauvais devenir de + **28%**

Recommandations NACC 2014 : PAS 140-180 mmHg jusqu'à reperfusion

NIHSS <15 : Δ PAM importe peu -> 78% indépendance fonctionnelle

NIHSS 15 – 20 : PAM > 70 mmHg

NIHSS > 20 : PAM > 80 mmHg

Réduire la PAS après revascularisation : 120-140 mmHg

RESPIRATION

Pulmonary and circulatory parameter guided anesthesia in patients with ischemic stroke undergoing endovascular recanalization

Etude avant – après instauration protocole standardisé d'AG

temps passé à EtCO₂
40-45 mmHg => Devenir défavorable

Takahashi et al.
Devenir défavorable à
32mmHg vs 35mmHg

35–40 mmHg

PENOMBRE ET
COLLATERALES

Hypotension + Hypocapnie = **DANGER**

To tube or not to tube? The role of intubation during stroke thrombectomy

Courtney Takahashi¹, Conrad W. Liang², David S. Liebeskind² and Jason D. Hinman^{2*}

¹ Department of Neurology and Neurocritical Care, Oregon Health and Science University, Portland, OR, USA

² Department of Neurology, David Geffen School of Medicine, University of California Los Angeles, Los Angeles, CA, USA

Hypotension

Hypocapnie

Facteurs MODIFIABLES

Délai

Pourquoi l'AG a toute sa
place?

Effect of Conscious Sedation vs General Anesthesia on Early Neurological Improvement Among Patients With Ischemic Stroke Undergoing Endovascular Thrombectomy: A Randomized Clinical Trial

Silvia Schönenberger, MD; Lorenz Uhlmann, MSc; Werner Hacke, MD, PhD; Simon Schieber, MD; Sibumundiyanapurath, MD; Jan C. Purrucker, MD; Simon Nagel, MD; Christina Klose; Johannes Pfaff, MD; Martin Bendzus, MD; Peter A. Ringleb, MD; Meinhard Kieser, PhD; Markus A. Möhlenbruch, MD; Julian Bösel, MD, FNCS

NSN = 150 pour Δ NIHSS $\geq$ 4 pts à H24 en faveur de CS (interv.)

Résultats :

- 65% thrombolyse dans GA et CS
- Door-to-puncture sous AG : 10 min
- Conversion en AG : 14%

Figure 3. Functional Outcome at 90-Day Follow-up in the Intent-to-Treat Population

SIESTA Study Schönenberger. JAMA 2017

EST in intubated state

E) Monitoring/Target values

1. SBP [mmHg] Limits:120-180, Target: 140-160
2. etCO₂ [mmHg] Limits: 35-45, Target: 40-45
3. SpO₂ [%] Limits: 90-100, Target: 95-98
4. RASS Limits; - 5 to -3, Target: -3 to -2

Analgesia and sedation adapted to Target values

EST in non-intubated state

E) Monitoring/Target values

1. SBP [mmHg] Limits:120-180, Target: 140-160
2. etCO₂ [mmHg] Limits: 35-45, Target: 40-45
3. SpO₂ [%] Limits: 90-100, Target: 95-98
4. RASS Limits; - 5 to -3, Target: -3 to -2

Analgesia/sedation adapted to Target values/Patient movements

Effect of General Anesthesia and Conscious Sedation During Endovascular Therapy on Infarct Growth and Clinical Outcomes in Acute Ischemic Stroke A Randomized Clinical Trial

128 patients – Monocentrique

CJP : Taille infarctus à J3

Indépendance fonctionnelle a 3 mois : **ns**

**General Anesthesia Versus Conscious Sedation
for Endovascular Treatment of Acute Ischemic Stroke**
The AnStroke Trial (Anesthesia During Stroke)

90 patients (1:1)

Exclusion : AVC VB, HIP, mRS ≥ 4

Per op

PaCO₂ : ns

PAM AG < Sédation

AMETIS study @AmetisStudy · Mar 17

Fin des inclusions dans l'étude AMETIS! Un grand merci aux patients et aux équipes. Désormais dans l'attente des résultats de la 1ère étude multicentrique portant sur la PEC anesthésique des thrombectomies pour AVCi de la circulation antérieure.

[Translate Tweet](#)

1

2

7

Monitored Anesthesia Care vs Intubation for Vertebrobasilar Stroke Endovascular Therapy

Rétrospectif – Pittsburg + Atlanta
215 patients -> 63 paires appariées

Sédation dans 36%

Conversion en AG dans 13%

Figure 2. Functional Outcome at 90 Days According to the Score on the Modified Rankin Scale

Shift analysis as assessed by the Wilcoxon signed rank test, $P = .19$. MAC indicates monitored anesthesia care and GA indicates general anesthesia.

Comment choisir la bonne
anesthésie?

A QUI AI-JE AFFAIRE ???

1/ DEFINIR LE RISQUE D'ECHEC DE LA SEDATION

A

MAINTIEN AUTONOME DE L'AIRWAY ?

REGURGITATION ?

B

MAINTIEN D'UNE VENTILATION ADEQUATE ?

HYPOXEMIE ?

HYPOVENTILATION ?

(C)

D

QUEL HEMISPHERE ? COOPERATION / APHASIE ?

EST-CE QU'IL ME COMPREND ?

SIGNES D'HTIC / AVC MALIN ?

EST-CE QU'IL PEUT ME REpondre ?

EN PRATIQUE ON FAIT
QUOI ?

RISQUE FORT

Agité

GCS $\leq$ 8

VA non protégées / Inhalation

Bulbaire / N. crâniens

Hypoventilation / Hypoxémie

Anatomie vascu difficile

RISQUE MOYEN

Aphasie

NIHSS $>$ 20

Risque d'AVC Malin

AVC vertébro-basilaire

Comorbidités majeures

FAIBLE RISQUE

Alerte + Coopérant

Hémisphère non-dominant

Anesthésie Générale ISR
Contrôle PA et EtCO₂

Jugement clinique
Avoir un plan B prêt
Equipe anesth expérimentée

Sédation
Analgesie
Contrôle TA

QUELLE AG?

Endovascular thrombectomy in acute ischemic stroke: new treatment guide

Arthur Wang^a and Apolonia E. Abramowicz^b

SIESTA, JAMA. 2016

Propofol
+
Rémifentanil

AnSTROKE, Stroke. 2017

Propofol
+
Sévo
+
Rémifentanil

GOLIATH, JAMA. 2018

Propofol
+
Alfentanil
+
Suxamethonium

ISR

AMINES

**General Anesthesia Versus Conscious Sedation
for Endovascular Treatment of Acute Ischemic Stroke**
The AnStroke Trial (Anesthesia During Stroke)

Noradrénaline

- KTA ?

- VVC ?

QUELLE SEDATION ?

Endovascular thrombectomy in acute ischemic stroke: new treatment guide

Arthur Wang^a and Apolonia E. Abramowicz^b

SIESTA, *JAMA*. 2016

Propofol
+
Rémifentanil

AnSTROKE, *Stroke*. 2017

Rémifentanil

GOLIATH, *JAMA*. 2018

Propofol
+
Fentanyl bolus

Dexmedetomidine: a safe alternative to general anesthesia for endovascular stroke treatment

Usefulness of Consciousness Sedation with Dexmedetomidine and Pentazocine during Endovascular Treatment for Acute Stroke

Dose :

IVSE débuté à 0.3 - 0.5 $\mu\text{g}/\text{kg}/\text{h}$

Entretien max : 1.0 $\mu\text{g}/\text{kg}/\text{h}$

+/- bolus : 0.5 $\mu\text{g}/\text{kg}$ IVL sur
5 min *si hémodynamique stable*

PAIN

Neuroradiology (2013) 55:93–100
DOI 10.1007/s00234-012-1084-y

INTERVENTIONAL NEURORADIOLOGY

Is general anaesthesia preferable to conscious sedation in the treatment of acute ischaemic stroke with intra-arterial mechanical thrombectomy? A review of the literature

N. John • P. Mitchell • R. Dowling • B. Yan

Céphalées sévères = 61%

- Ballon
- Manipulation du KT / vsx cérébraux

Les chiffres à retenir

MORTALITE dans l'AVC thrombectomisable **15-25 %**

Indépendance fonctionnelle à 3 mois **50 %**

Revascularisation correcte (TICI 2b/3) **75 %**

Conversion Sédation – AG

15 %

Objectif EtCO₂

35 - 40 mmHg

Objectifs tensionnels

Pendant revascularisation

TAS 140 – 180 mmHg

PAM > 70 mmHg

Après revascularisation

PAS 120 – 140 mmHg

Utilisation vasopresseurs

Sédation : 30% / AG 80-90%

Ilyas. World Neurosurg. 2018

A complex, colorful network of neural connections, resembling a brain scan or a neural network diagram. The image features a dense web of thin, multi-colored lines (red, blue, yellow, green, purple) against a dark background. Several larger, more prominent nodes or clusters are visible, some with bright colors like yellow and cyan. The overall structure is intricate and interconnected, suggesting a highly complex system. In the upper right corner, the text "TIME IS BRAIN" is overlaid in a bold, white, sans-serif font.

TIME IS BRAIN