CHU BDX CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BORDEAUX universit BORDEAUX

Contre-pulsion intra-aortique (CPIA): ses principes, ses indications

Pr. Edouard Gerbaud
Soins Intensifs Cardiologiques
Plateau de Cardiologie Interventionnelle
Hpital Cardiologique du Haut Lvque
CHU de Bordeaux

CHU BDX CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BORDEAUX universit BORDEAUX

Dfinition

- Dispositif temporaire de soutien circulatoire mis en place de manire invasive par voie fmorale, via un dsilet 8F, dans l'aorte descendante sous contrle scopique.
- 1re application clinique en 1968 pour un diagnostic de choc cardiognique (Dr Kantrowitz)

CHU BDX CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BORDEAUX universit BORDEAUX

Histoire

History:

- 1962** Animal studies
Mouloupoulos et al. Am Heart J 1962;63:669-675
- 1968** First clinical description in shock
Kantrowitz et al. JAMA 1968;203:135-140
- 1973** Hemodynamic effects in shock, Mortality unchanged
Scheidt et al. NEJM 1973;288:979-984

> 40 years > 1 Million patients treated, low complication rate, Benchmark registry
Ferguson et al. JACC 2001;38:1456-1462

CHU BDX CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BORDEAUX universit BORDEAUX

- La perfusion d'une coronaire se fait en diastole et surtout pour l'artre coronaire gauche

CHU BDX CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BORDEAUX universit BORDEAUX

Choc cardiognique

CHU BDX CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BORDEAUX universit BORDEAUX

Fonctionnement

- Ballon en Silicone de 30 ou 40 cc (++)
- Hlium
- Synchronisation sur l'ECG pour
 - Se gonfler en dbut de diastole
 - Se dgonfler (de manire active) avant le dbut de la systole

CHU BDX CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BORDEAUX **université BORDEAUX**

Quel Gain?

- Cela dépend
 - de la fréquence cardiaque
 - du volume du ballon

- de la sténose coronaire

CHU BDX CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BORDEAUX **université BORDEAUX**

Le problème de la sténose coronaire

• Il faut l'enlever

- par angioplastie ou par pontage aorto-coronarien

CHU BDX CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BORDEAUX **université BORDEAUX**

Quel Gain?

Cardiogenic Shock

- SBP < 90 mmHg
- MAP < 65 mmHg
- Altered mental status
- Cool extremities
- Lactate > 2 mmol/L
- PAOP > 18 mmHg
- CI < 2.0 L/min/m²
- CI < 1.8 L/min/m²

Echc, EKG, X-ray, blood gases, biochemical analysis, arterial line, CVC

Fluid assessment, vasopressors, inotropes, advanced monitoring (PAC, TPID)

Etiologic diagnosis (PCI, thrombolysis, drainage)

Refractory shock (increasing vasoactive requirement, worsening hemodynamic parameters)

Organ failure

Heart Team

Select the most appropriate assist device

0 - TL, 1 - 2L, 2 - 3L, 3 - 4L, 4 - 5L, 5 - TL

Impella 2.5, Tandemheart, Impella CP, Impella 5.0, VA - ECMO

Augmentation du débit cardiaque d'environ 0.5 L/min

Hajjar LA et al. Crit Care 2019;23:76

CHU BDX CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BORDEAUX **université BORDEAUX**

Les indications

- Choc cardiogénique dans un contexte de syndrome coronarien aigu
 - lésion isolée de l'IVA proximale (atteinte mono-tronculaire)
 - « Pré-choc »: patient « limite / borderline » sur le plan hémodynamique avec faible dose concomitante d'amines vasopressives
- Angioplastie protégée / « High risk PCI »
- Infarctus du ventricule droit

Gerbaud E et al. Arch Cardiovasc Dis 2020; 113:276-284

CHU BDX CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BORDEAUX **université BORDEAUX**

Les indications

- Réduire la post-charge du ventricule gauche
- Augmenter le volume d'éjection systolique effectif en diminuant le shunt G>D ou en diminuant le volume régurgitant mitral

Archives of Cardiovascular Diseases, Volume 112, Issue 12, December 2019, Pages 792-798

Is there still a role for the intra-aortic balloon pump in the management of cardiogenic shock following acute coronary syndrome?

Le ballon de contre pulsion intra-aortique a-t-il encore un intérêt dans la prise en charge du choc cardiogénique ?

- Pré-chirurgie cardiaque
 - pontages aorto-coronariens (tronc commun)
 - insuffisance mitrale
 - communication interventriculaire
- Période « post-opératoire » de chirurgie cardiaque
- Décharge ECMO

Galleano Laurent¹, R. M. Vincent Aulfiat², Camille Pichard³, Marc Laine⁴, Laurent Bonello⁵

Leurent G et al. Arch Cardiovasc Dis 2019; 112:792-798

CHU BDX CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BORDEAUX **université BORDEAUX**

Intra-Aortic balloon pump for acute decompensated heart failure complicated by cardiogenic shock

Cardiogenic Shock related to **VS**

Acute Decompensated Heart Failure VS Acute Myocardial Infarction

Hemodynamic Benefits through IABP:

- Increasing diastolic aortic coronary pressure (diastolic pressure time index, DTI)
- Reducing myocardial oxygen demand (tension time index, TTI)
- Increasing Brouha index (DT/TTI)
- Increasing Cardiac Output
- Improving ventriculo-arterial coupling
- Improving Right Ventricular function
- Direct action on Mitral valve anatomy and physiology

Hemodynamic Effects hampered by tachyarrhythmias -> optimize triggering (autopilot mode recommended)

Morici N et al. J Cardiac Failure 2022; 28:1202-1216
Brown MA et al. J Am Heart Assoc. 2021 Aug 3; 10(15): e019376

CHU BDX CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BORDEAUX

Les contre-indications

université BORDEAUX

- Insuffisance aortique
- Syndrome douloureux aortique, dissection, hématome de paroi, anévrisme aortique...
- Accès artériel membre inférieur insuffisant
- « Relative »: Les tachycardies

CHU BDX CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BORDEAUX

Les recommandations dans le STEMI

université BORDEAUX

Intra-aortic balloon pumping should be considered in patients with haemodynamic instability/cardiogenic shock due to mechanical complications.	IIa	C
Short-term mechanical support ^c may be considered in patients in refractory shock.	IIb	C
Routine intra-aortic balloon pumping is not indicated. ^{177,437}	III	B

^c Percutaneous cardiac support devices, ECLS, and ECMO

Ibanez S et al. *Eur Heart J* 2018; 39:119-177

CHU BDX CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BORDEAUX

Images de BPCIA

université BORDEAUX

Héparinothérapie IVSE durant l'utilisation avec un objectif d'héparinémie / Activité anti Xa (HNF): 0,3-0,4 UI/mL

CHU BDX CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BORDEAUX

Surveillance

université BORDEAUX

- Surveillance
 - clinique: point de ponction, membre inférieur, transit, diurèse
 - biologique: anticoagulation, hémoglobine, plaquettes, lactates artériels
 - radiologique: radiographie pulmonaire de face
- Les Traitements
 - anticoagulation
 - anxiolytiques
- La console
 - pas d'arrêt prolongé
 - optimisation de l'inflation
 - présence de fuites
 - niveau d'hélium

CHU BDX CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BORDEAUX **université BORDEAUX**

Effets secondaires

- Thrombopénie
- Thrombose artérielle
- Hypoperfusion rénale, mésentérique, ou du membre inférieur

⚠ douleur abdominale chez le (la) patient(e) porteur d'une CPIA

CHU BDX CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BORDEAUX **université BORDEAUX**

Sevrage et retrait

⚠ Dispositif transitoire! A enlever dès que possible!

- Sevrage progressif (1 inflation tous les 2 cycles cardiaques puis 1 inflation tous les 4 cycles cardiaques)
- Arrêt de l'héparinothérapie 1 heure avant
- Soit préclosing à la pose
- Soit compression manuelle fémorale (30 minutes) sous couvert d'antalgiques

IABP SHOCK II

Randomized comparison of intraaortic balloon counterpulsation versus optimal medical therapy in addition to early revascularization in acute myocardial infarction complicated by cardiogenic shock

Holger Thiele, MD
 Uwe Zeymer, MD; Franz-Josef Neumann, MD; Miroslaw Ferenc, MD; Hans-Georg Olbrich, MD; Jörg Hausleiter, MD; Gert Richardt, MD; Marcus Hennersdorf, MD; Klaus Empen, MD; Georg Fuernau, MD; Steffen Desch, MD; Ingo Eitel, MD; Rainer Hambrecht, MD; Jörg Fuhrmann, MD; Michael Böhm, MD; Henning Ebelt, MD; Steffen Schneider, PhD; Gerhard Schuler, MD; Karl Werdan, MD

on behalf of the **IABP-SHOCK II** Investigators
 University of Leipzig – Heart Center

Methods Study Sites and Organisation

DSMB:
 Kurt Huber
 Ferenc Follath
 Bernhard Maisch
 Johannes Haerting

Steering committee:
 Holger Thiele
 Karl Werdan
 Uwe Zeymer
 Gerhard Schuler

Support + Patronage:
 DFG Deutsche Forschungsgemeinschaft

Methods Statistical Methodology

Sample Size:

- Estimated 12% absolute difference in survival rates
- Sequential statistical design with 2 interim analyses (33% and 66% of patients)
- Significance level 0.0005 at 1st or 0.014 at 2nd interim analysis.
- Final analysis at α -level 0.044 → 564 patients
- To compensate losses in follow-up and putative center effect → 600 patients

Primary Study Endpoint:
 30-day all-cause mortality

Secondary Study Endpoints:

- Hemodynamic parameters (mean BP, heart rate pre and post revascularization)
- Serum-lactate (every 6 h for 48 h)
- SAPS-2 Score
- Serial creatinine-level and creatinine-clearance (Cockcroft-Gault-formula)
- Inflammatory reaction (CRP)

Process of care:

- Time until hemodynamic stabilization
- Catecholamine dose and duration
- Requirement for LVAD-implantation or HTx
- Requirement for renal replacement therapy
- Length of ICU-stay
- Length of mechanical ventilation
- Mortality after 6 and 12 months

Thiele et al. Am Heart J 2012;163:938-45

Results Patient Characteristics

	IABP (n=301)	Control (n=299)
Age (years), median (IQR)	70 (59-78)	69 (58-76)
Male sex, n (%)	202 (67.1)	211 (70.6)
Current Smoking, n/total (%)	86/28 (30.7)	106/296 (35.8)
Hypertension, n/total (%)	213/66 (70.4)	196/296 (66.2)
Hypercholesterolemia, n/total (%)	122/55 (41.4)	102/296 (34.4)
Diabetes mellitus, n/total (%)	102/27 (37.4)	94/296 (31.8)
Body mass index (kg/m ²), median (IQR)	27.5 (24.7-30.1)	26.3 (24.1-29.0)
Prior myocardial infarction, n/total n (%)	71/90 (23.7)	61/99 (26.4)
Prior PCI, n/total n (%)	63/29 (21.7)	52/99 (17.4)
Prior CABG, n/total (%)	20/90 (6.7)	12/99 (4.0)
Fibrinolysis < 24 h before randomization, n/total (%)	28/91 (8.3)	20/99 (6.7)
STEMI/MI, n/total (%)	30/90 (33.3)	21/99 (21.1)
NSTEMI, n/total (%)	96/90 (33.0)	81/99 (27.2)
Revascularization before randomization, n/total (%)	127/91 (42.2%)	143/99 (47.8)
Types of impaired organ perfusion, n/total (%)		
Adrenal mental status	215/90 (71.7)	235/99 (77.9)
Cerebral	257/90 (85.7)	245/99 (81.1)
Oliguria	90/90 (30.0)	76/99 (25.3)
Small bowel < 2 meals/d	205/90 (71.8)	215/99 (71.9)
Creatinine clearance (ml/min), median (IQR)	65.7 (43.4-86.6)	56.4 (29.7-78.1)
Infect related artery, n/total (%)		
LAD	132/90 (45.1)	121/99 (41.3)
LAD	52/90 (18.0)	52/99 (18.2)
LAD	73/90 (24.3)	78/99 (27.0)
LAD	36/90 (12.0)	36/99 (12.1)
Bypass graft	72/90 (24.4)	67/99 (22.7)
Multivessel disease, n/total (%)	235/90 (78.1)	235/99 (78.6)
LAD vessel occlusion fraction (%), median (IQR)	35 (25-45)	35 (25-45)

Results Treatment + Process of Care Outcomes

Variable	IABP (n=301)	Control (n=299)	P
Primary PCI, n/total (%)	287/301 (95.3)	286/299 (95.6)	0.55
Start implanted, n/total (%)	273/301 (90.7)	296/299 (99.0)	0.48
Drug-eluting stent, n/total (%)	126/301 (41.9)	122/299 (41.1)	0.86
Immediate PCI of non-culprit lesions, n/total (%)	90/301 (29.9)	81/299 (27.1)	0.45
Immediate bypass surgery, n/total (%)	8/91 (7.7)	10/99 (3.3)	0.62
Staged bypass surgery, n/total (%)	3/301 (1.0)	4/99 (1.3)	0.72
Active left ventricular assist device, n/total (%)	11/201 (5.3)	22/299 (7.4)	0.103
Mechanical ventilation, n/total (%)	190/301 (63.1)	122/299 (40.8)	0.21
Duration of mechanical ventilation (days), median (IQR)	3.0 (1.0-8.0)	3.0 (1.0-8.0)	0.44
Duration of intensive care treatment (days), median (IQR)	6.9 (3.0-12.0)	6.9 (3.0-13.0)	0.34
Refractory hypotension therapy, n/total (%)	42/301 (13.9)	47/299 (15.7)	0.12
Anticoagulation and antithrombotic, n/total (%)			
Aspirin	293/299 (98.0)	294/299 (98.3)	0.87
Clopidogrel	216/299 (72.2)	206/299 (68.9)	0.40
Prasugrel	86/299 (28.8)	79/299 (26.4)	0.72
Ticagrelor	19/24 (8.1)	19/28 (6.8)	0.32
Glycoprotein IIb/IIIa inhibitors	180/299 (60.2)	175/299 (58.5)	0.83
Low molecular weight heparin	96/299 (32.1)	96/299 (32.1)	0.94
Bivalirudin	26/299 (8.7)	36/299 (12.1)	0.34
Catecholamines (µg/kg per minute), median (IQR)			
Dobutamine	41 (0-87.7)	43 (0-88.3)	0.76
Norepinephrine	0.3 (0.1-1.2)	0.4 (0.1-1.1)	0.73
Epinephrine	0.3 (0.1-1.1)	0.3 (0.1-1.4)	0.39
Dopamine	10.2 (4.9-20.6)	9.2 (4.6-17.6)	0.25
Duration of catecholamines (days), median (IQR)	3.0 (1.0-5.5)	3.0 (1.0-6.5)	0.81
Time to hemodynamic stabilization (days), median (IQR)	3.0 (1.0-5.5)	3.0 (1.0-6.5)	0.50

Summary + Conclusions

- IABP support in cardiogenic shock is safe without significant inherent complications.
- However, IABP support did not reduce 30-day mortality in this large, randomized, multicenter trial in cardiogenic shock patients complicating myocardial infarction undergoing early revascularization.
- The primary study endpoint results are supported by a lack of benefit in secondary endpoints.

Conclusion

- Encore largement utilisé quand pas d'autre système disponible !

- Garde un « potentiel intérêt » dans certaines indications
 - Patient jeune, IVA proximale, « pré-choc »

 - Complications mécaniques de l'infarctus

 - Pré ou post- chirurgie cardiaque