université
de BORDEAUX

Techniques de suppléance hépatique

Antoine Dewitte

Réanimation Magellan, CHU de Bordeaux

CNRS, UMR 5164 Immunoconcept, Université Bordeaux

- **Introduction**

Introduction

Les fonctions hépatiques sont multiples et complexes : synthèse protéique, biotransformation, détoxification, excrétion, réponse immunitaire et hormonale...

Introduction

- **Pronostic particulièrement sombre des défaillances hépatiques aiguës**
 - Sur foie sain
 - Sur hépatopathie préexistante
- **Greffe hépatique reste le TTT de choix, mais**
 - Geste chirurgical lourd
 - Traitement immunosuppresseur à vie

Introduction

Objectifs théoriques des techniques de suppléance hépatiques:

- **Détoxification:**
 - Eliminer du sang les toxines qui sont normalement métabolisées par le foie:
 - Toxines non hydrosolubles (acides biliaires, bilirubine, etc.)
 - Substances liées aux protéines dans le sang, essentiellement à l'albumine
 - Ces toxines ne peuvent pas être filtrées par dialyse conventionnelle ou CRRT
- **Métabolisme et synthèse de différentes protéines**
 - Glucuronoconjugaison
 - Synthèse de l'urée
 - Métabolisme du « diazépam »
- **Contrôle de la réponse inflammatoire et immunitaire**

Introduction

- Recherche de méthodes de suppléance hépatique depuis plus de 50 ans
- **Une longue liste d'échec...**
 - Hémodialyse pour traiter l'hyperammoniémie en 1955
Kiley JE et al. N Engl J Med. 1958
 - Hémofiltration, hémoperfusion et plasmaperfusion sur des membranes adsorbantes
Gazzard BG et al. Lancet. 1974
O'Grady JG et al. Gastroenterology. 1988
Stockmann HB et al. Ann Surg. 2000
Nyberg SL et al. Am J Surg. 1993
- **Intensification des travaux de recherche sur les dernières décennies :**
 - Meilleure biocompatibilité des matériaux.
 - Amélioration du pouvoir de détoxification par adsorption d'éléments toxiques.
 - Association avec un dialysat
 - Mise au point de foies bioartificiels

- Introduction
- **Principes**

Plusieurs approches techniques :

1. Perfusion extracorporelle de foies animaux et/ou humains
2. Hépatocytes dans des systèmes de foie bioartificiel
3. Méthodes de détoxification mécanique sans matériel cellulaire.

Principes: perfusion extracorporelle

Circulation croisée avec chiens

Cross dialysis treatment using four living dogs Hori et al; 1958

Principes: perfusion extracorporelle

Perfusion sur foie porcin ex vivo

The Venovenous Circuit for ex Vivo Pig-Liver Perfusion

Chari RS et al, N. Engl J Med 1994

Principes: techniques bioartificielles

- **Quatre dispositifs testés:**
 - Extracorporeal liver assist device (ELAD[®] (Vitagen))
 - Système HepatAssist[®] (Circe Biomedical)
 - Bioartificial Liver Support System (BLSS (Excorp Medical))
 - Bioartificial extracorporeal Liver Support (BELS (Gerlach))

Principes: techniques bioartificielles

Principes: techniques bioartificielles

L'extracorporel liver assist device (ELAD[®] (Vitagen))

HepatAssist (Circe Biomedical)

- bioréacteur à fibres creuses à base de polysulfone
- oxygénateur pour les hépatocytes
- colonne de charbon actif revêtu de cellulose

SUPLIVER: Bioartificial supply for liver failure

S. Figaro^{a,b}, U. Pereira^a, A-S. Dumé^d, H. Rada^b, S. Capone^{c,d}, A. Bengrine^e, A. Baze^f,
E. Rabenirina^f, N. Semenzato^b, Y-E. Herpe^e, J. Faivre^c, M. Dufresne^a, L. Richert^f, G. Duverlie^e,
M. Daujat-Chavanieu^d, F. Saliba^c, D. Pouchoulin^b, C. Legallais^{a,*}

IRBM 36 (2015) 101–109

**Cellules hépatiques
humaines encapsulées dans
une structure poreuse
sphérique (billes d'alginate)
et cryopréservées**

Principes: techniques bioartificielles

- Législations européennes en faveur d'un moratoire sur les applications cliniques de la **xénotransplantation**:
 - Risques pour la santé publique, en particulier, la transmission de virus présents dans la source animale au patient receveur et à ses proches
- Interdiction de l'utilisation d'hépatocytes animaux dans les **applications cliniques** des BAL.
- Problème des hépatocytes issus **d'hépatoblastome** (lignées immortalisées)

Principes: techniques artificielles

- Nombreuses techniques purement **artificielles** apparues depuis vingt ans
- **2 principales:**
 - Système MARS[®] (molecular adsorbents recycling system)
(Baxter)
 - Système Prometheus[®] (Fresenius)

Principes: techniques artificielles

La dialyse simple: SPAD

- (SPAD) **dialyse à l'albumine** utilisant une machine d'hémofiltration rénale conventionnelle
- Le sang du patient traverse un circuit avec une membrane à fibres creuses identique à celle du MARS en polysulfone.
- Le dialysat circulant à contre courant est une solution d'Albumine qui est **jetée** après le passage dans le filtre.

Principes: techniques artificielles

SPAD et Prismaflex

Membrane en polysulfone HF 1400

Principes: techniques artificielles

Prometheus[®]

Principes: techniques artificielles

Prometheus[®]

F 60 S Dialyzer

Adsorber prometh[®] 02

Adsorber prometh[®] 01

AlbuFlow[®]

Concentrate (Bic.and acid)

Principes: techniques artificielles

MARS®

MARS

EER : PRISMAFLEX

Principes: techniques artificielles

MARS®

Principes: techniques artificielles

MARS®

MARS®

- Introduction
- Principes
- **En pratique**

MARS: en pratique

X-MARS[®]

Filtre MARS[®] FLUX

Set Prismaflex MARS[®]

Adsorbours

Tubulures - Unité 1

Tubulures - Unité 2

Tubulures - Unité 3

Tubulures - Unité 4

Tubulures - Accessoires

Réinitialiser

MARS: en pratique

Composants de la thérapie

1. Moniteur MARS
2. Moniteur Prismaflex : thérapie CRRT MARS et set MARS activés.
3. Filtre MARSFLUX
4. diaMARS IE250
5. diaMARS AC250
6. Set Prismaflex MARS
7. Seringue, si nécessaire
8. Poche effluent
9. Solution PPS
10. Solution de dialysat
11. Solution réinjection

MARS: en pratique

Composants de la thérapie

1. Moniteur MARS 1 TC (logiciel 15 ou 16)
2. Moniteur Prismaflex : thérapie CRRT MARS et set MARS activés.
3. Filtre MARSFLUX
4. diaMARS IE250
5. diaMARS AC250
6. Set Prismaflex MARS
7. Seringue, si nécessaire
8. Poche effluent
9. Solution PPS
10. Solution de dialysat
11. Solution réinjection

MARS: en pratique

Composants de la thérapie

1. Moniteur MARS 1 TC (logiciel 15 ou 16)
2. Moniteur Prismaflex : thérapie CRRT MARS et set MARS activés.
3. Filtre MARSFLUX
4. diaMARS IE250
5. diaMARS AC250
6. Set Prismaflex MARS
7. Seringue, si nécessaire
8. Poche effluent
9. Solution PPS
10. Solution de dialysat
11. Solution réinjection

MARS: en pratique

Composants de la thérapie

1. Moniteur MARS 1 TC (logiciel 15 ou 16)
2. Moniteur Prismaflex : thérapie CRRT MARS et set MARS activés.
3. Filtre MARSFLUX
4. diaMARS IE250
5. diaMARS AC250
6. Set Prismaflex MARS
7. Seringue, si nécessaire
8. Poche effluent
9. Solution PPS
10. Solution de dialysat
11. Solution réinjection

MARS: en pratique

Composants de la thérapie

1. Moniteur MARS 1 TC (logiciel 15 ou 16)
2. Moniteur Prismaflex : thérapie CRRT MARS et set MARS activés.
3. Filtre MARSFLUX
4. diaMARS IE250
5. diaMARS AC250
6. Set Prismaflex MARS
7. Seringue, si nécessaire
8. Poche effluent
9. Solution PPS
10. Solution de dialysat
11. Solution réinjection

MARS: en pratique

Composants de la thérapie

1. Moniteur MARS 1 TC (logiciel 15 ou 16)
2. Moniteur Prismaflex : thérapie CRRT MARS et set MARS activés.
3. Filtre MARSFLUX
4. diaMARS IE250
5. diaMARS AC250
6. Set Prismaflex MARS
7. Seringue, si nécessaire
8. Poche effluent
9. Solution PPS
10. Solution de dialysat
11. Solution réinjection

MARS: en pratique

Composants de la thérapie

1. Moniteur MARS 1 TC (logiciel 15 ou 16)
2. Moniteur Prismaflex : thérapie CRRT MARS et set MARS activés.
3. Filtre MARSFLUX
4. diaMARS IE250
5. diaMARS AC250
6. Set Prismaflex MARS
7. Seringue, si nécessaire
8. Poche effluent
9. Solution PPS
10. Solution de dialysat
11. Solution réinjection

MARS: en pratique

Composants de la thérapie

1. Moniteur MARS 1 TC (logiciel 15 ou 16)
2. Moniteur Prismaflex : thérapie CRRT MARS et set MARS activés.
3. Filtre MARSFLUX
4. diaMARS IE250
5. diaMARS AC250
6. Set Prismaflex MARS
7. Seringue, si nécessaire
8. Poche effluent
9. Solution PPS
10. Solution de dialysat
11. Solution réinjection

MARS: en pratique

Composants de la thérapie

1. Moniteur MARS 1 TC (logiciel 15 ou 16)
2. Moniteur Prismaflex : thérapie CRRT MARS et set MARS activés.
3. Filtre MARSFLUX
4. diaMARS IE250
5. diaMARS AC250
6. Set Prismaflex MARS
7. Seringue, si nécessaire
8. Poche effluent
9. Solution PPS
10. Solution de dialysat
11. Solution réinjection

MARS: en pratique

Composants de la thérapie

1. Moniteur MARS 1 TC (logiciel 15 ou 16)
2. Moniteur Prismaflex : thérapie CRRT MARS et set MARS activés.
3. Filtre MARSFLUX
4. diaMARS IE250
5. diaMARS AC250
6. Set Prismaflex MARS
7. Seringue, si nécessaire
8. Poche effluent
9. Solution PPS
10. Solution de dialysat
11. Solution réinjection

MARS: en pratique

MARS[®] FLUX

Seul filtre du kit de traitement MARS en contact avec le sang

- **Détoxification** du sang dans ce filtre, dont la membrane est traversée par les toxines hydrosolubles et liées aux protéines.
- Contrairement à l'HD ou l'HF, une solution **d'albumine** est utilisée du côté dialysat du filtre.
- L'albumine sert à transporter **les toxines liées aux protéines**. Les toxines du sang traversent ainsi la membrane semi-perméable jusqu'à ce dialysat d'albumine propre non chargé, de l'autre côté.
- Le dialysat d'albumine contenant des toxines est ensuite redirigé dans le circuit fermé et régénéré en plusieurs étapes.

MARS: en pratique

MARS[®]FLUX

Membrane semi-perméable synthétique (polysulfone) laissant passer les substances dont le poids moléculaire < 50 kDa

MARS: en pratique

MARS® FLUX

Concentration élevée en albumine du « dialysat » (15% environ) qui permet le passage à travers la membrane des toxines liées à l'albumine.

Les substances hydrosolubles, de faibles poids moléculaires, passent également dans le dialysat.

MARS: en pratique

Filtre diaFLUX

- Ce filtre n'est pas en contact avec le sang, mais détoxifie le dialysat d'albumine.
- L'albumine en provenance du filtre MARSFLUX, qui contient des **toxines hydrosolubles** et liées à des protéines, traverse les fibres intérieures de ce filtre.
- Les toxines hydrosolubles sont éliminées du dialysat d'albumine par **diffusion et/ou convection**.
- Par la suite, le dialysat d'albumine ne contient plus que les toxines liées aux protéines.

MARS: en pratique

Cartouches d'adsorbent

- **Élimination des toxines liées aux protéines**
- L'adsorbent AC250 est rempli de **charbon actif** non imprégné, particulièrement adapté à l'élimination des composés non polaires à faible poids moléculaire, tels que les hydrocarbures polycycliques aromatiques ou les acides gras.
- L'adsorbent IE250 est rempli d'une **résine échangeuse d'ions** particulièrement appropriée pour l'élimination des molécules anioniques, telles que la bilirubine.
- Le filtre à petites particules situé entre les deux capte la poudre de charbon dégagée par l'adsorbent AC250.

Une fois que le dialysat d'albumine a traversé les deux cartouches d'adsorbent, l'albumine régénérée retourne au filtre MARSFLUX afin d'éliminer davantage de toxines du sang.

MARS: en pratique

Poches et solutions

Amorçage du système Prismaflex :

1 cycle d'amorçage avec 2 litres de sérum physiologique (il est possible d'ajouter de l'anticoagulant à la solution d'amorçage).

Amorçage du système MARS :

3,5 litres de solution d'amorçage non héparinée.

Sérum-albumine humain : 500 ml de **SAH à 20 %** ou **400 ml de SAH à 25 %**.

Traitement :

Solutions de dialysat et de réinjection

Il est vivement recommandé d'utiliser exclusivement des **solutions tamponnées à base de bicarbonate** pour le traitement de patients atteints de défaillance hépatique.

MARS: en pratique

Montage: 2 IDE (1 dédiée + 1 surveillance patient)
= **1h35 mini** pour IDE expérimentée et **sans message d'erreur**

(souvent 2h)

40 mn : *purge (temps machine)*

Attention → Bulles = ECHEC DEFINITIF

MARS: en pratique

Prescriptions des débits:

- **Débit sang:** maximum recommandé pour X-MARS est **250 ml/min**, en prenant en considération le fait qu'il s'agit du débit maximum du circuit d'albumine MARS (la plage du set est comprise entre 10 et 450 ml/min).
- **Débits de PPS** (500ml/min)
- **Débit de dialysat** (500ml/min)
- **Débit de réinjection** (500ml/min)
- Prélèvement de liquide patient à définir

The screenshot shows the 'Entrer Prescr. Débits' screen on a MARS machine. At the top right, the date and time are '08/December/17 21:07' and the user is 'Prép. CVVHDF'. A text box at the top left provides instructions: 'Pour ajuster la prescription, appuyer sur la touche appropriée puis utiliser les flèches. Une fois prêt, appuyer sur TOUT CONFIRM. Voir l'Aide pour plus d'informations.' The main area is a dark blue panel with a list of flow rate categories on the left: 'Sang', 'Pré pompe sang', 'Dialysat', 'Réinjection', 'Pré ou Post', and 'Prélèv. liquide patient'. The 'Pré pompe sang' category is highlighted with a yellow box, and the text 'PPS = Pré Pompe sang' is visible below it. On the right side of the panel, there are several control buttons: 'EFFACER', an up arrow, a down arrow, and 'TOUT CONFIRM.'. At the bottom of the screen, there is a row of seven buttons labeled 'SANG', 'PPS', 'DIALYSAT', 'REINJ.', 'PRE ou POST', 'PRELEV. LIQ. PAT.', and 'AIDE'.

REMARQUE : les débits d'ultrafiltration combinés totaux excédant 1 500 ml/h (prélèvement du liquide patient+PPS+réinjection) peuvent déclencher des avertissements PTM élevés, ainsi que de fausses alarmes de coagulation dues à une pression PTM élevée.

MARS: en pratique

Prescription Anticoagulation:

- HNF IVSE
- Souvent aucune

08/December/17 21:17
Prép. CVVHDF

Entrer Prescription Anticoagulation

Pour ajuster la prescription, appuyer sur la touche appropriée puis utiliser les flèches.
Une fois prêt, appuyer sur TOUT CONFIRM. Voir l'Aide pour plus d'informations.

Pousse-seringue

Choix : Continu ou Bolus

Continu

Débit

Le logiciel prend en compte le volume perfusé via le pousse-seringue.

Taille seringue compatible : 50 ml
Marque seringue compatible : TERUMO

ADMINIST. CONTI- DEBIT CONTI- ADMINIST. BOLUS

CHANGER SERINGUE
EFFACER
▲
▼
TOUT CONFIRM.
AIDE

MARS: en pratique

Accès vasculaire:

La voie d'accès au sang du patient doit être soigneusement évaluée. Le site d'accès doit être défini par le médecin.

Un accès veineux correcte constitue l'un des principaux facteurs pour assurer le débit sanguin requis.

MARS: en pratique

Surveillance des pressions:

- **Système MARS :**
 - Pin : pression avant les cartouches de l'adsorbéur
 - Pout : pression après les cartouches de l'adsorbéur
- **Système Prismaflex :**
 - Entrée
 - Hémofiltre
 - Retour
 - Effluent
- Logiciel calcule les pressions suivantes :
 - Pression transmembranaire (PTM)
 - Perte de charge du filtre (perte de charge)

MARS: en pratique

Modalités de Traitement:

- **3 séances de 8 heures pendant 3 jours consécutifs**
- Puis 2-3 fois/semaine si amélioration clinique ou biologique
- Prudence dans les modalités de l'anticoagulation du circuit (coagulation filtre, saignement)

MARS: en pratique

Bilirubine adsorbée

- Introduction
- Principes
- En pratique
- **Indications**

Indications

- **Insuffisance hépatique chronique décompensée**
(Acute-on-chronic liver failure)
- **Insuffisance hépatique aiguë**
- **Dysfonction de greffon après transplantation**
- **Insuffisance hépatique après hépatectomie**
- **Prurit résistant avec cholestase**

⇒ **Bridge to recovery or transplantation**

Contre-indications théoriques

Ou plutôt non-indications

- **Sepsis non contrôlé / choc septique**
- **> 3 défaillances d'organes**
- **Hémodynamique instable**
- **Hémorragie aiguë**
- **Coagulopathie sévère**
 - Plaquettes < 50 000 / mm³
 - INR > 2,5-3 ou TP < 30 %

- Introduction
- Principes
- En pratique
- Indications
- **Cas clinique**

Cas clinique: hépatite fulminante

Mr P, 33 ans:

- Patient admis pour **intoxication médicamenteuse volontaire**
- Prise de **40g de Paracétamol**, 5 comprimés de Pantoprazole 20mg et 16 comprimés de Lamaline dans un contexte de séparation conjugale (2 intoxications médicamenteuses volontaires en 2 mois)
- Pas d'antécédent particulier
- Pas de prise d'alcool, pas de drogue

Cas clinique: hépatite fulminante

- Apparition de **nausées, vomissements et de douleurs abdominales** amenant le patient aux urgences
- A son admission:
 - Patient glasgow 15, calme, orienté
 - Paracétamolémie à 258,8 mg/L (H18)
 - **TP à 45 %**
 - Thrombopénie (39 G/L)
 - Fonction rénale normale
 - **ASAT à 425 U/L, ALAT à 555 U/L**, pas de cholestase, bilirubinémie : 30 μ mol/L.

L'IHA est dite sévère quand le TP est inférieur à 50 %

L'IHA est dite grave quand s'associe à la baisse du TP une encéphalopathie.

L'IHA est dite sévère quand le TP est inférieur à 50 %

L'IHA est dite grave quand s'associe à la baisse du TP une encéphalopathie.

R2.3 – En cas d'IHA sévère, quelle que soit l'étiologie suspectée, les experts suggèrent de prendre contact auprès d'un centre de transplantation hépatique pour discuter :

- la prescription d'un bilan étiologique de seconde intention si le bilan initial (selon R1) est négatif
- l'indication de transplantation hépatique

Avis experts

Cas clinique: hépatite fulminante

- Le patient est **transféré** en hépatologie le lendemain
- **Protocole N-Acetyl-Cysteine** débuté
- **Dégradation progressive du bilan hépatique à J2**
 - Majoration de la cytolysse hépatique
 - **Facteur V à 5 %**
 - **TP < 15 %**
 - Augmentation progressive de la **lactatémie**.
 - Fonction rénale stable avec diurèse conservée
 - Hypoglycémies persistantes malgré G30 %
- **Toujours aucun signe d'encéphalopathie** / Absence de défaillance hémodynamique

Transfert en réanimation

Cas clinique: hépatite fulminante

Actes médicaux planifiés	Nutrition/ Diététique	Inflammation / Infection	F ^e rénale	Biochimie	Hémato/Divers	Monitoring Neuro	ECMO	CCAM vérifications	Transfusion	Documents exportés	Informations patient/famille								
											15/5/17		16/5/17		17/5/17		18/5/17		
Heures		1400	2000	200	800	1400	2000	200	800	1400	2000	200	800						
												1437				2648 - HL REA / SC MAGELLAN			
.Uree sg			4,2	4,5	5,5	6,4	6,1	5,9	5,1	4,4	4,6								
.Creatinine sg			92	69	72	80	71	67	64	59	55								
.Sodium veineux			138	137	137	135	133	135	138	136	138								
.Potassium veineux			3,2	3,2	3,6	4,7	4,5	4,4	4,6	4,4	4,3								
.Chlore veineux			102	105	106	106	107	107	110	111	112								
.Bicarbonates veineux			19	23	22	18	21	25	23	24	23								
.Trou anionique (sans Mg)			20	12	13	16	10	7	10	5	7								
.Phosphore sg			1,38	0,54	0,7	0,67	0,66	0,44	0,33	0,45	0,32								
.Calcémie			2,33	2,1	2,16	1,95	1,86	1,94	1,94	1,91	1,94								
.Calcémie corrigée (alb)			2,29		2,25	2,17													
.Calcémie corrigée (prot)			2,37		2,33	2,23	2,2	2,32	2,32	2,26	2,32								
.Ca++ artériel			1,09	1,05	1,11	1		1,06	1,09	1,09	1,07								
.Proteines sg			69		56	52	47	46	46	47	46								
.Albumine			41,8		33,9	31,4													
.Bilirubine totale			44	70	81	77	82	92	108	115	122								
.Bilirubine directe			14	23	31	±	36	42	44	52	59								
.Bilirubine indirecte			30	47	50	49	46	50	64	63	63								
.ASAT(TGO)			868	3 100	6 843	11 200	15 780	17 150	15 250	12 000	9 300								
.ALAT(TGP)			1 076	3 094	6 023	9 200	13 200	14 150	14 500	15 150	12 650								

Cas clinique: hépatite fulminante

Actes médicaux planifiés		Nutrition/ Diététique		Inflammation / Infection		F° rénale		Biochimie		Hémato/Div ers		Monitoring Neuro		ECM		CCAM vérifications		Transfusion		Documents exportés	
Heures		16/5/17				17/5/17				18/5/17											
		200	800	1400	2000	200	800	1400	2000	200	800	1400	2000								
		2648 - HL REA / SC MAGELLAN																			
.Globules blancs	10	6,28				10,61	9,66	9,56	9,44	9,47	8,41	7,49	8,19								
.Poly Neutrophiles	8,69						9,3	9,22			7,7										
.Lymphocytes	0,87						0,31	0,29			0,51										
.Eosinophiles	0						0	0,01			0,14										
.Monocytes	0,43						0,04	0,03			0,04										
.Basophiles	0,01						0,01	0,01			0,01										
.Hematies	5	4,88				4,45	4,15	3,99	4,13	4,33	4,23	4,45	4,27								
.Hemoglobine	15,2	14,6				13,5	12,6	12,1	12,6	13,2	13,1	13,4	13,1								
.Hématocrite	44,7	43,1				39,4	37	35,3	36,1	37,9	37,1	39	37,4								
.VGM	89,5	88,3				88,5	89,3	88,3	87,5	87,5	87,6	87,7	87,8								
.Plaquettes	53	54				67	66	63	58	62	71	59	60								
.TP	32	16				<15	<15	<15	<15	<15	<15	<15	<15								
.INR	2,42	4,59				6,94	>10	>10	>10	>10	>10	>10	8,91								
.Ratio TCA HBPM	1,22	1,63				1,7	1,83	2,14	2,34		1,64	1,58	1,4								
.Calcémie	2,33	2,1				2,16	1,95	1,86	1,94	1,94	1,91	1,94	1,91								
.Fibrinogène Clauss	2,3	1,6					1,3	1,1	1,1		1,1		0,9								
.Fibrinogène dérivé	±	±					±	±			±		±								
.Facteur 2	60	31				22	13	8	9	10	12	12	13								
.Facteur 5	26	7				5	<5	<5	<5	6	6	7	10								
.Facteur 7									<5	±	±										
.Facteur 10									<5	±	±										

Cas clinique: hépatite fulminante

Intérêt d'une suppléance hépatique?

- Élimination de certaines toxines
- Réduire EH et coma
- Éviter Œdème cérébral

- Mais pas de substitution à la fonction de synthèse hépatique

MARS: Molécules épurées

TOXINES

Bilirubine
Acides biliaires
Ammoniac
Benzodiazépines endogènes
Digoxine
Tryptophane
NO

MEDICAMENTS

Diazépam
Furosémide
Halopéridol

MARS: Molécules épurées

N=32
(69 cycles)

	MARS, median (IQR)		Difference
	Before	After	
Bilirubin, $\mu\text{mol/L}$	323 (255.5–372.0)	249 (192.0–286.5)	*
GGT, $\mu\text{mol/L}$	1.69 (0.805–4.567)	1.52 (0.760–4.125)	*
TBA, $\mu\text{mol/L}$	119 (51.6–245.1)	75 (30.9–167.0)	*
ABiC, %	67 (55.2–80.6)	76 (67.5–90.4)	*
IL-6, pg/ml	142 (62.4–358.9)	123 (63.0–268.8)	n.s.
IL-8, pg/ml	66 (46.2–100.9)	65 (49.7–94.9)	n.s.
Creatinine, $\mu\text{mol/L}$	132 (85.5–186.5)	101 (64.0–145.9)	*
Urea, mmol/L	11.6 (7.13–17.10)	10.5 (6.60–15.30)	*

TBA total bile acid, ABiC albumin-binding capacity

MARS: Molécules épurées

	MARS, median (IQR)		Difference
	Pre-ECAD	Post-ECAD	
pH	7.42 (7.374–7.447)	7.42 (7.390–7.449)	n.s.
SBC, mmol/L	27.3 (24.03–31.48)	27.5 (24.70–30.60)	n.s.
Base excess, mmol/L	3.9 (0.03–8.35)	3.8 (0.70–7.20)	n.s.
Lactate, mmol/L	1.9 (1.30–2.70)	2.1 (1.70–3.00)	*
Sodium, mmol/L	142 (138.3–146.0)	143 (139.0–147.0)	n.s.
Potassium, mmol/L	4.5 (4.20–4.70)	4.2 (3.90–4.60)	*
Calcium, mmol/L	1.24 (1.140–1.330)	1.15 (1.090–1.260)	*
Glucose, mmol/L	6.9 (5.70–8.00)	7.3 (6.15–8.05)	n.s.
Osmolality, mOsmol/kg H ₂ O	305.1 (295.85–320.79)	305.7 (297.24–319.79)	n.s.

SBC standard bicarbonate

MARS et encéphalopathie hépatique

Glasgow coma score
 Δ : 1.3 (0.5)
P=0.02

Grade of hepatic encephalopathy
 Δ : -0.7 (0.3)
P=0.02

Cas clinique: hépatite fulminante

- Dégradation neurologique avec apparition d'une **encéphalopathie de stade II-III** et agitation importante à J3 (glycémie normalisée):
- **TDM cérébrale**: discret œdème cérébral
- Doppler trans-cranien subnormal

Indication à un traitement MARS retenue

Inscription sur liste de TH

Critères de Transplantation Hépatique pour Hépatite Fulminante (Clichy-Villejuif)

- **Age > 30ans:**

Confusion ou coma

Associé à un facteur V < 30%

- **Age < 30 ans:**

Confusion ou coma

Associé à un facteur V < 20%

Critères de Transplantation Hépatique pour Hépatite Fulminante au paracétamol (King's college)

- **Envisager la TH si:**
 - Lactate > 3,5 mmol/L
- **Transplantation si:**
 - pH < 7.3 ou lactate >3,5 mmol/L après 4h ou >3 mmol/L après 12h de réanimation et optimisation volémique.
 - Ou
 - Créatinine > 300 µmol/L
 - INR > 6,5
 - Encéphalopathie de grade 3 ou plus

Cas clinique: hépatite fulminante

- **Une seule séance de MARS réalisée**
- Nette **amélioration neurologique** malgré une confusion persistante et une somnolence
 - EEG tracé en faveur d'une encéphalopathie hépatique sans élément paroxystique
- Evolution concomitante **favorable**:
 - Amélioration progressive du bilan hépatique sur un mode cholestatique
 - Lente récupération neurologique
 - TDM cérébrale injectée à J7 superposable à celle de J3
- Sortie en hépatologie après **10 jours** en réanimation

Principes: techniques artificielles

essais randomisés vs TMS

Randomized control trial with ALS devices vs standard medical therapy.

Study	Device	Study population	Outcome
Heemann (Ref. [34])	MARS	AoCLF ($n = 24$)	Improvement of 30-day survival
Hassanien (Ref. [32])	MARS	Hepatic encephalopathy ($n = 70$)	Improvement of encephalopathy
RELIEF (Ref. [35])	MARS	AoCLF ($n = 189$)	No effect on 28-day survival
HELIOS (Ref. [36])	Prometheus	AoCLF ($n = 145$)	No effect on 28-day survival
FULMAR (Ref. [31])	MARS	ALF ($n = 102$)	No effect on survival

MARS et insuffisance hépatite aiguë

Albumin Dialysis With a Noncell Artificial Liver Support Device in Patients With Acute Liver Failure

A Randomized, Controlled Trial

Faouzi Saliba, MD; Christophe Camus, MD; François Durand, MD; Philippe Mathurin, MD, PhD; Alexia Letierce, PhD; Bertrand Delafosse, MD; Karl Barange, MD; Pierre François Perrigault, MD; Magali Belnard; Philippe Ichaï, MD; and Didier Samuel, MD, PhD

MARS et insuffisance hépatite aiguë

Étude FULMAR

Predictive Factors for 6-Month Survival According to Clinical and Biological Variables at Baseline Before Randomization

Variable	Univariate Analysis		Multivariate Analysis (<i>n</i> = 89)	
	OR (95% CI)	<i>P</i> Value	Adjusted OR (95% CI)	<i>P</i> Value
Age (OR for 5 y)	0.99 (0.83–1.19)	0.92	0.89 (0.66–1.21)	0.46
Male sex (reference, female sex)	2.34 (0.86–6.36)	0.095	1.71 (0.36–8.00)	0.50
MARS treatment (reference, conventional treatment)	1.82 (0.67–4.93)	0.24	2.57 (0.53–12.48)	0.24
Paracetamol cause (reference, nonparacetamol cause)	1.83 (0.68–4.90)	0.23	0.15 (0.02–0.96)	0.044
Creatininemia (OR for 10 IU)	0.84 (0.73–0.96)	0.009	0.99 (0.93–1.06)	0.83
Total bilirubinemia (OR for 100 IU)	1.00 (0.97–1.03)	0.91	0.99 (0.93–1.05)	0.70
Fibrinogen level (OR for 0.1 IU)	1.09 (1.00–1.19)	0.057	1.15 (0.98–1.33)	0.081
Lactate level (mmol/L)	0.89 (0.83–0.96)	0.004	0.84 (0.73–0.97)	0.016
ALT level (OR for 100 IU)	1.01 (0.99–1.02)	0.37	1.01 (0.98–1.03)	0.54
Encephalopathy grades 0–2 (reference, grades 3–4)	1.30 (0.48–3.50)	0.61	1.26 (0.24–6.53)	0.78
No inotropic support (reference, inotropic support)	5.77 (1.73–19.19)	0.004	5.01 (0.68–36.85)	0.112
Prothrombin level (%)	1.01 (0.94–1.09)	0.79	0.82 (0.67–1.01)	0.062
MELD score at inclusion <40 (reference, MELD score ≥40)	4.31 (1.17–15.88)	0.028	29.68 (0.51–1737.50)	0.102

MARS et insuffisance hépatite aiguë

Étude FULMAR

Limitation: The short delay from randomization to liver transplantation (median, 16.2 hours) precludes definitive efficacy or safety evaluations.

MARS et insuffisance hépatite aiguë

Probabilité de transplantation significativement plus élevée dans le groupe MARS (27 [55.1%] vs. 39 [73.6%]; P 0.04)

	Patients Who Remained in the Study, n						
MARS	53	40	25	20	17	15	14
Conventional	49	42	31	28	23	22	22

Log-rank test, $P = 0.04$. MARS = Molecular Adsorbent Recirculating System.

Cas clinique: ACLF

Mr G, 44 ans:

- **Antécédent:**

- Hémorragie digestive par rupture de VO révélant une cirrhose: Ligature à l'élastique puis traitement par B-bloquants (2015)
- **Cirrhose alcoolique + virale C :**
 - Sevrage de l'alcool. VHC traité
 - Diabète insulino-dépendant

- **Histoire actuelle:**

- Choc hémorragique nécessitant un remplissage, ventilation mécanique et traitement par sandostatine, antibioprophylaxie et ligature à l'élastique
- Dégradation de la fonction hépatique dans les suites: ALAT: 3000 UI, TP 23%, Bilirubine totale 575 $\mu\text{mol/L}$

=> ACLF (Acute on Chronic Liver Failure)

Cas clinique: ACLF

- **Traitement médical simple? Admission en réa ?**
- **Transfert vers un centre expert ?**
- **Dialyse à l'albumine ?**
- **Inscription sur liste de transplantation hépatique ?**

CANONIC (29 centres): pronostic des patients selon la présence ou non d'ACLF

Definition de la défaillance d'organe score CLIF-SOFA (score SOFA modifié pour la Cirrhose)

Organe/système	0	1	2	3	4
Foie (Bilirubine, mg/dL)	< 1.2	≥ 1,2 - ≤ 1,9	≥ 2 - ≤ 5,9	≥ 6 - <12	≥ 12
*Rein (Créatinine (mg/dL))	< 1.2	≥ 1,2 - ≤ 1.9 >41- ≤ 55 mL/mn	≥ 2 - < 3,5 >24 - ≤41 mL/mn	≥ 3,5 - < 5 ≤ 24	≥ 5
			ou épuration rénale		
*Cerveau (grade d'EH)	Pas d'EH	1	2	3	4
*Coagulation (INR)	< 1,1	≥ 1,1 – < 1,25	≥ 1,25 - < 1,5	≥ 1,5 – < 2,5	≥ 2,5 ou Plaquettes ≤ 20x10 ⁹ /L
*Circulation (PAM mm Hg, γ/kg/mn)	≥ 70	< 70	Dopamine ≤5 ou Dobutamine ou Terlipressine	Dopamine > 5 ou Ad ≤ 0,1 ou Nad ≤ 0,1	Dopamine > 15 ou Ad > 0,1 ou Nad > 0,1
Poumons PaO ₂ /FiO ₂ ou SpO ₂ /FiO ₂	> 400 > 512	> 300 - ≤ 400 > 357 - ≤ 512	> 200 - ≤ 300 > 214 - ≤ 357	> 100 - ≤ 200 > 8 - ≤ 214	≤ 100 ≤ 89

Moreau R et al, *Gastroenterology* 2013; 144:1426–1437

*modifications au score SOFA

CANONIC (29 centres): pronostic des patients selon la présence ou non d'ACLF

n=1343

Cas clinique: ACLF

A l'admission:

Clinique : conscient, hépatomégalie, ictère et ascite

Biologie: Bilirubine totale **663** $\mu\text{mol/L}$; ASAT/ALAT: 97/44; GGT: 35 UI/l

TP: 37%; **Facteur V: 37%**, INR 2,24, Albumine 35,5g/L

Sérologies : VHB, VIH : négatives, VHC(+), ARN VHC négatif

Cultures : hémocs, urines et ascite sont négatives

Child-Pugh : C10 , **MELD = 31**

CLIF-SOFA : 2

IGS II : 43

Que peut-on espérer d'un traitement par système MARS?

Hepatic

- Increased Hepatic Blood flow (HBF)
- Increased Hepatic delivery of O₂ (HDO₂)
- No change in (HvO₂)*
- Decrease of Portal Pressure

* Hepatic venous oxygen consumption

Median Reduction rate per session:

- Total bilirubin : 23% (range 17-29)
- Direct bilirubin RRs : 28% (21-35)
- Indirect bilirubin RRs : 8% (3-21)
- Ammonia RRs : 34% (12-86)
- Conjugated cholic acid RRs : 58% (48-61)
- Chenodeoxycholic acid RRs : 34% (18-48)

Hemodynamic

- Increased Mean arterial Pressure (MAP)
- Decrease cardiac output
- Increased Vascular systemic resistance
- Decrease in NO

Renal

- Decrease Renin
- Decrease Aldosterone
- Decrease Norepinephrine
- Increased Atrial natriuretic peptide

MARS et ACLF

1. Bañares R et al. *Hepatology* 2013;57(3):1153-62
2. Gerth HU et al. *Critical Care Med* 2017; 45(10):1616-24

RELIEF RCT: 28 days transplant-free survival

Cumulative probability of the 28-day transplant-free survival rate

ACLF grade 2

Survie des patients atteints d'ACLF et traités avec MARS®

MARS et ACLF

Mortality Prediction by Recursive Partitioning Analysis

14-day mortality, % (patients)

Mortality n, (%)	HR	95% CI	p
Bilirubin	0	0.94-1.14	0.5
MARS®	0.17	0.05-0.60	0.006
ACLF score Grade 3 vs. 1	11.29	3.10-41.06	< 0.001
CLIF OF Brain subscore 3 vs. 1	16.0	1.54-166.08	0.020

MARS et ACLF

1-year survival of patients transplanted with ACLF3 while in ICU and non-transplanted matched controls with MOF

1-year survival of patients transplanted with MOF while in ICU according to ACLF grade

Transplantation hépatique pour les patients cirrhotiques avec ACLF en soins intensifs

Cas clinique: ACLF

19 Juin – 4 Juillet

MARS® : 6 séances de 8 h de traitement

Cas clinique: Hépatite sub-aigüe

3 séances

3 séances

		8/7/18	9/7/18	10/7/18	11/7/18	12/7/18	13/7/18	14/7/18	15/7/18	16/7/18	17/7/18	18/7/18
24 Heures		1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400
2648 - HL REA / SC MAGELLAN												14
BIOCHIMIE	Glucose veineux (mmol/L) ㊦											6,1
	Uree sg	6,8	7,2	6,6	6,3	5,1	5,3	5,5	6,2	4,9	3,7	3,8
	Creatinine sg	33	32	28	23	24	27	23	19	16	11	11
	Sodium veineux	145	146	141	141	143	144	144	143	143	142	144
	Potassium veineux	4,17	4,23	4,05	3,93	4,56	3,93	3,81	4,28	4,12	3,75	3,43
	Chlore veineux	110	109	108	109	109	106	106	105	108	107	108
	Bicarbonates veineux	29	29	28	26	26	29	30	29	26	24	24
	Trou anionique (sans Mg)	10	12	9	10	13	13	12	13	13	15	15
	Calcemie	1,97	1,95	1,97	2,05	2,1	2,13	2,07	2,12	2,04	2,22	2,16
	Calcemie corrigee (prot)	2,52	2,56	2,56	2,6	2,58	2,58	2,53	2,57	2,45	2,59	2,5
	Proteines sg	37	34	35	38	42	44	43	44	45	49	50
	Bilirubine totale	447	416	368	384	416	511	524	576	486	471	502
	Bilirubine directe	314	299	240	241	236	308	324	368	312	253	309
	Bilirubine indirecte	133	116	129	144	180	203	199	208	175	218	193
	ASAT(TGO)	119	98	111	115	136	133	132	122	117	138	137
ALAT(TGP)	194	172	134	136	144	135	140	129	119	138	147	
GGT	61	58	47	36	36	35						

Cas clinique: Hépatite sub-aigüe

3 séances

3 séances

		10/7/18	11/7/18	12/7/18	13/7/18	14/7/18	15/7/18	16/7/18	17/7/18	18/7/18	19/7/18	20/7/18	
		600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	
		2648 - HL REA / SC MAGELLAN											
HEMATOLOGIE	Globules blancs	8,12	8,07	5,99	5,95	6,59	5,63	5,83	7,69	6,73	5,88	12,73	
	Poly Neutrophiles	5,17		4,8				6,06		5,54	15,52	11,81	
	Lymphocytes	1,11		0,59				0,9		0,62	0,31	0,45	
	Eosinophiles	0		0				0,02		0,01	0	0	
	Monocytes	1,84		0,59				0,79		0,52	0,53	0,42	
	Basophiles	0		0,01				0,02		0,04	0,05	0,05	
	Hematies	3,06	2,85	2,95	2,46	2,53	2,37	2,54	2,44	2,39	2,73	2,93	
	Réticulocytes												192
	Hemoglobine	8,2	7,9	8,1	7	7,2	6,8	7,5	7,3	7,2	8,2	8,8	
	Hématocrite	23,6	22,7	23,6	20,4	21,1	20	21,6	21,2	21,1	24,2	25,5	
	VGM	77,1	79,6	79,9	83,1	83,7	84,5	85,3	86,7	88,1	88,3	86,8	
	Plaquettes	65	44	31	42	42	43	40	42	42	50	57	
	Recherche Schizocytes			Présence									
	Numeration Schizocytes			0									
COAGULATION	TP	23	21	22	19	17	21	15	<10	<10	<10	35	
	INR	3,19	3,47	3,28	3,74	4,05	3,48	4,65	>10	>10	>10	2,15	
	Ratio TCK				2,71								
	Ratio TCA	2,48	2,9	3,41	>8		3,23	>8	>8	>8	>8	2,86	
	Calcémie	1,98	2,05	2,1	2,13		2,07	2,04	2,22	2,16	1,85	2,15	
	Fibrinogène Clauss	0,8	0,5	0,5	0,4	0,4	0,8	0,4	0,4	<0,4	<0,4		
	Fibrinogène dérivé	1,4	1	1,2	0,7	0,6	1,4	0,8	0	0	3,2	4,2	
	Facteur 2	19	12	13	12		11	12	10	10	10	21	
Facteur 5	45	29	29	30	30	36	32	25	22	7	44		

Cas clinique: ACLF

Evolution:

- Amélioration de l'encéphalopathie hépatique.
- Amélioration modérée de la fonction hépatique
- Evaluation complète pour TH avec avis addictologie : pas de contre-indication

- *Inscription sur liste d'attente TH le 27 Juin*
- CI Temporaire du 6 au 10 Juillet :
 - Culture positive *E. Coli* BLSE dans l'ascite et urine

Transplantation hépatique le 19 Juillet

Sortie Réa, le 26 Juillet (1 semaine plus tard)

- Introduction
- Principes
- En pratique
- Indications
- Cas clinique
- **Conclusion**

Conclusion

- Concernant les systèmes de suppléance hépatique , 2 essais contrôlés, dont un randomisé incluant 115 patients avec IHA (non liée à un choc cardiogénique), n'ont pas montré de diminution significative de la mortalité (données regroupées : RR = 0,82 ; IC95% 0,42-1,59) [32,33]. La place des suppléances hépatiques dans le management des patients présentant une IHA n'est pas définie ; ces techniques ne doivent pas retarder la prise en charge du patient par un centre de TH.

MERCI !