

Etude in vitro de la séquestration des médicaments par les dispositifs médicaux avec CEC

Quelles conséquences thérapeutiques?

Frédéric Baud

 Université de Paris Cité
 Société NeckEpur

www.capso.fr

Conflits d'intérêt

NeckEpur SA

Plan

- I. Classification des DM-CEC
- II. Rappel de pharmacocinétique in vitro et conséquences sur les méthodes
- III. Déterminants de la séquestration CKRT & ECMO. Conséquences thérapeutiques
- IV. Résultats acquis. Conséquences thérapeutiques
- V. Perspectives
- VI. Conclusions

Plan

- I. Classification des DM-CEC
- II. Rappel de pharmacocinétique in vitro et conséquences sur les méthodes
- III. Déterminants de la séquestration CKRT & ECMO. Conséquences thérapeutiques
- IV. Résultats acquis. Conséquences thérapeutiques
- V. Perspectives
- VI. Conclusions

- Sur le plan pharmacocinétique, Un dispositif médical avec CEC n'est rien d'autre qu'un organe supplémentaire, certes externe, mais agissant généralement en parallèle des autres.
- La pharmacocinétique clinique décrit la PK des organes qu'ils soient internes ou externes.
- Mais les principes de la pharmacocinétique d'organe ne sont pas appliqués dans leur plénitude => résultats incomplets voire questionnables.

1. Classification des DM-CEC (théorie générale des systèmes (1/3))

Systèmes Clos	Systèmes ouverts
Cardiopulmonary bypass	Renal replacement therapy
Heart Bypass	Continuous Renal Replacement Therapy
Extracorporeal Membrane Oxygenation Different modes of ECMO: veno-venous and arteriovenous	Hybrid Renal Replacement Therapy
ECCO2R	Intermittent Renal Replacement Therapy
Hemoperfusion	Peritoneal dialysis
Non-specific hemoperfusion	Ultrafiltration
Specific columns of hemoperfusion	Cytapheresis
	Plasma exchange, plasmapheresis
	Molecular recirculating adsorbent system and similar devices (ex: MARS)

(Von Bertalanffy 2012)

=> La classe du DM définit la méthode d'étude de l'interaction médicament - DM-CEC


1. Classification des DM-CEC: Système clos (2/3)


Filtres :

1. Bloc oxygénateur-pompe de l'ECMO
2. Hémoadsorption
 - Spécifique: LPS, cytosorb, ...
 - Non-spécifique

Trois sites de prélèvements:

1. Compartiment central
2. Entrée
3. Sortie


 Schneider AG. Nature.scientific.com 2021
<https://doi.org/10.1038/s41598-021-89965-z>



Plan

- Classification des DM-CEC
- Rappel de pharmacocinétique in vitro et conséquences sur les méthodes
- Déterminants de la séquestration CKRT & ECMO. Conséquences cliniques
- Résultats acquis. Conséquences cliniques
- Perspectives
- Conclusions

Termes utilisés pour désigner cette interaction médicament-dispositif

Trapping: Rumpf 1977
 Binding: Kronfol 1987, Roehr 2015: CRRT
 Sequestration: Heith 2019, Mathieu 2021, Mehta 2007, Nasr 2019, Shekar 2012 & 2015) ECMO
 Adsorption (n=21): Bayd 2020a, 2020b, 2022, Breuer 2021, Choi 2004, Clark 1995, Economou 2020, Honoré 2019, Jamal 2015, Kolbinger 2018, Lam 2010, Lewis 2015, Malard 2018, Onichimowski 2020a, 2020b, Shinashi 2012, Tian 2009a, 2009b, 2009c, 2011, Wan 2019: CRRT
 Absorption (n=2): Li 2020 (CRRT), Wilschut 2010 (ECMO)

en CKRT: adsorption
 en ECMO : sequestration
 Littérature asiatique absorption plutôt qu'adsorption
 Termes indexés dans la MESH data base (PubMed): adsorption, absorption

Signification des termes
 Binding, séquestration : factuelle
 Adsorption, absorption: mécanistique
 ⇒ **Sequestration**

Importance de comprendre l'effet du milieu sur le dosage: 4 milieux possibles ne donnant pas les mêmes concentrations

Fluid	Comment
Plasma	Whole blood is centrifuged after adding an anticoagulant, such as heparin or citric acid. Cells are precipitated. The supernatant fluid, plasma, contains proteins that often bind drugs. The concentration in plasma comprises bound and unbound drug.
Serum	Whole blood is centrifuged after the blood has been clotted. Cells and material forming the clot, including fibrinogen and its clotted form, fibrin, are removed. Binding of most drugs to fibrinogen and fibrin is insignificant. Although the protein composition of serum is slightly different from that of plasma, the drug concentrations in serum and plasma are virtually identical.
Whole Blood	Whole blood contains red blood cells, white blood cells, platelets, and various plasma proteins. An anticoagulant is commonly added and during analysis, the drug is commonly extracted into an organic phase often after denaturing the plasma proteins. The blood drug concentration represents an average over the total sample. Concentrations in the various cell fractions and in plasma may be very different.

In vitro : dans solution cristalloïde équilibrée = ultrafiltrat plasmatique = forme libre du médicament (C_{bound})
 forme active en pharmacocinétique et pharmacodynamie

Etude de la séquestration en milieu liquide

Séquestration en milieu liquide =

Interaction réversible et saturable d'un médicament avec des sites non actifs

Etude basée sur deux principes:

- Conservation de la matière = stabilité
- Loi d'action de masse:

$$A + B \rightleftharpoons AB$$

$$K = \frac{(AB)}{(A) \times (B)}$$

Le milieu liquide ne doit pas induire d'effet propre

$$A + B + Prot \rightleftharpoons AB + Bprot + Aprot$$

Etude de la séquestration en milieu liquide

Le milieu liquide ne doit pas induire d'effet propre:
 Le sang total : n'est pas adapté pour deux raisons:

- Distribution des médicaments entre cellules sanguines et plasma (Blood-to-plasma ratio)
- Hémolyse spontanée in vitro visible au bout d'une heure qui est inéluctable

+++ Le sang est un tissu liquide avec une fraction cellulaire vivante, fragile qui a des besoins métaboliques propres

Distribution des médicaments entre cellules sanguines et plasma

Un précurseur avant-gardiste, un seuil!!!

Intensive Care Med (2015) 36:2109–2116
DOI 10.1177/1461308515268141

PEDIATRIC ORIGINAL

E. B. Wildschut
M. J. Aben
K. Algra
R. A. A. Meijer
D. Tibboel

Determinants of drug absorption in different ECMO circuits

Results

Ratio of whole blood/plasma

Ratio of whole blood/plasma concentrations

Theoretical maximum concentration in blood was calculated by dividing the administered dose by the volume of the ECMO circuit. However, since drug assays were performed in plasma, the ratio between the plasma and the blood concentration had to be determined to calculate drug recovery. The blood plasma ratio was calculated as the average of the concentration in spiked whole blood samples divided by spiked plasma samples. This was done in triplicate; the mean value was used to calculate whole blood concentrations from measured plasma concentrations.

The average ratios of whole blood/plasma for each drug were 1.41 (meropenem), 1.23 (vancomycin), 1.21 (cefazolin), 0.94 (morphine), 0.90 (paracetamol), 0.77 (fentanyl) and 0.75 (midazolam). There was no discernible trend in ratio versus incubation time. The relative standard deviation over all whole blood samples was 10% or less.

9^e JOURNÉES CAPSO

Distribution entre cellules sanguines et plasma des médicaments: - Blood-to-plasma ratio -

Drug	Blood-to-plasma ratio	Ref
Amikacin	1.23	(Ferreira et al., 2021)
Gentamicin	1.11	(Ferreira et al., 2021)
Tobramycin	1.31	(Ferreira et al., 2021)
Vancomycin	0.68	(Ferreira et al., 2021)
Vancomycin	0.55	(Emoto et al., 2018)
Vancomycin	1.23*	(Wildschut et al., 2010)
Linezolid	0.83	(Ligens et al., 2023)
Nitroimidazole	2.85	Antoine
Clindamycin	7.59	(Yang et al., 2007)
Propofolone	5.5	(Roos et al., 1981)
Morphine	0.94*	(Wildschut et al., 2010)
Paracetamol	0.90*	(Wildschut et al., 2010)
Fentanyl	0.77*	(Wildschut et al., 2010)
Midazolam	0.75*	(Wildschut et al., 2010)

Wildschut et al 2010
RBC vieux d'une semaine

Amoxicillin	0.67	(Lu et al., 2016)
Cefazolin	0.55	(De Sutter et al., 2023)
Cefuroxime	1.23*	(Wildschut et al., 2010)
Cefazidime	0.55	(De Sutter et al., 2023)
Ceftriaxone	0.55	(Song et al., 2020)
Cefepime		NR
Piperacillin	0.55	(De Sutter et al., 2023)
Ticarcillin		NR
Imipenem	0.55	(Song et al., 2020)
Meropenem	0.55	(De Sutter et al., 2023)
	1.41*	(Wildschut et al., 2010)

Conséquences pharmacocinétiques du B-to-P ratio:

- Effet précoce quelque soit sa valeur: site de séquestration non pris en compte = faux positif de séquestration non liée au filtre
- Effet tardif lors de l'hémolyse: <1 provoque dilution = faux positifs
>1: masquer une séquestration dans le filtre
= 1: pas d'impact PK

9^e JOURNÉES CAPSO

Hémolyse spontanée in vitro, visible au bout d'une heure, est inéluctable

- L'incubation du sang total à 37°C pendant une période supérieure à 1 h cause une hémolyse, changeant la couleur du plasma qui devient rose ou rougeâtre ce qui se traduit par des résultats de dosages très variables.

- La différence des rapports de répartition à 10 et 60 minutes d'incubation fournit des informations concernant la cinétique de séparation d'un médicament entre plasma et cellules sanguines.

Facteurs des DM-CEC contribuant à l'hémolyse:

- Pompes occlusives en CKRT
- Métabolisme anaérobie des GR: apport de glucose ?

Prélèvements hémolysés :



Indices : 0 1-2 3-4 5
Dosages : oui oui non non

9^e JOURNÉES CAPSO

Pharmacocinétique in vitro: les questions à considérer

1. Quel milieu liquide faut-il utiliser?

Si la question est la mesure de paramètres pharmacocinétiques tels que la clearance globale, le sieving coefficient, Sc en filtration, ou le coefficient de saturation, Sa en dialyse, le sang total, le plasma ou un cristalloïde chargé en albumine sont les plus adaptés.

⇒ Nécessité de travailler sur des temps courts, mesure Hte et non Hb, surveillance de l'hémolyse

Si la question est l'étude de la séquestration des médicaments dans le circuit, un milieu cristalloïde voire de l'eau ppi sont les plus adaptés.

2. Expression des résultats

En EERC: taux d'adsorption (mg ou %) mais en ECMO surtout taux de récupération très rarement taux de séquestration

Taux d'adsorption/séquestration = 1 - taux de récupération

9^e JOURNÉES CAPSO

Milieus liquides utilisés dans les études de séquestration en CKRT

Medium	n
Cristalloïdes	22
Sang dilué/reconstitué	30

Le problème n'est pas de mesurer une concentration. Mais de comprendre la signification de ce que l'on mesure

Par rapport à un milieu cristalloïde, l'albumine, le plasma (Ab+AG+LP+lgG), le sang reconstitué (Protéines+GR+GB+plaquettes) apportent des facteurs de séquestration qui vont prévenir la séquestration dans les filtres comme le diminuent aussi la distribution, ralentissent l'élimination, diminuent les concentrations libres au niveau des câbles.

Est-ce qu'ils diminuent la séquestration? Oui, car l'élément-clé de la concentration sanguine et la concentration plasmatique libre qui diminuent dans les différentes proportions.

Qu'est-ce qui n'est pas connu actuellement?

Les constantes d'association et de dissociation des complexes et les vitesses correspondantes de formation et de libération.

Mesure dans plasma ou sang reconstitué = taux relatif de séquestration

Mesure dans cristalloïde = taux intrinsèque de séquestration

9^e JOURNÉES CAPSO

Plan

- I. Classification des DM-CEC
- II. Rappel de pharmacocinétique in vitro et conséquences sur les méthodes
- III. Déterminants de la séquestration CKRT & ECMO. Conséquences thérapeutiques
- IV. Résultats acquis. Conséquences thérapeutiques
- V. Perspectives
- VI. Conclusions

9^e JOURNÉES CAPSO

Déterminants de la séquestration en CKRT

Structure chimique des filtres

Du « plus au moins » adsorbant:

Polyacrylonitrile (PAN +/-PEI) > Polyamide/Méthyl métacrylate > Polysulfones

Polysulfone = polysulfone, polyethersulfone, polyarylsulfone (polybenzylsulfones)

Vrai pour les protéines et les cellules sanguines (Clark 1995, Clark 1999)

Extrapolés par Schetz (2007) et Li et coll (2020) aux médicaments **MAIS** sans preuves expérimentales

Ratio de publications 2 PAN pour 1 PS

9^e JOURNÉES CAPSO

Déterminants de la séquestration en CKRT – Conséquences thérapeutiques

Propriétés des médicaments

- Masse moléculaire
- Rayon d'hydratation
- Charge moléculaire (ionisation) *Kronfol 1987*
- Liaison aux protéines
- Aire de surface polaire (non ionisé) *Baud 2021a*
- Doses répétées sur même filtre *Baud 2021b*
- Présaturation lors du priming *Hauze 2025*

Lipophilie? Pour les médicaments les plus séquestrés 5 sur 6 sont hydrophiles

Gentamicin – ST150			
% Adsorption	J-1	J-2	J-3
	65	43	19

Baud 2021b

Propriétés des membranes

- Nature chimique des filtres
- Taille des pores
- Charge membranaire
- Longueur et largeur des fibres *Kronfol 1987*
- Surface du filtre
- Débit de dialfiltration *Baud 2020*
- Durée des sessions *Baud 2025*

Amikacin – ST150
R² = 0.9976
Y = 16.9 X + 84.1

9^e JOURNÉES CAPSO

Reproductibilité des résultats avec méthode NeckEpur (1/2)

Pour 44 sessions, tous médicaments, tous filtres, tous modes et tous débits de dialyse/filtration/diafiltration confondus

Y = 0.9595 * X + 3.34 (R² = 0.9460, p < 0.0001)

Differences in % sequestration = f(360-T)
Y = 0.0095 * X - 27.53 (R² = 0.9182)

Durant des sessions de durée moyen: 467 ± 314 min
Le % de médicament éliminé du CC est de 95%.
En comparaison avec la durée la plus longue, une durée de 300 min: pas d'effet significatif sur le taux.
Pour des durées inférieures, le taux calculé surestime la séquestration, laissant moins de temps à la filtration.
Possible de corriger la valeur d'un facteur de proportion déterminé par la méthode NeckEpur.

Le biais est de 1.7%.
La limite supérieure à 95% de désaccord est de 18.8%.
A comparer par rapport à l'erreur analytique.

9^e JOURNÉES CAPSO

Déterminants de la séquestration en ECMO et colonnes adsorptives non spécifiques

ECMO :

- HLS Set Advanced 5.0 -> 7.0 (Getinge) : **polyméthylpentène** (*Mathieu et coll ASAIO J 2021*)
- Capiox RX 15 -> 25R (Terumo): Fibres creuses de **polypropylène** avec coque de polycarbonate
En plus de l'héparine fixée, nature des traitements: Xcoating™ surface coating (Terumo) ?
- Medtronic **silicone membrane** of roller pump circuits (*Mehta 2007, Wildschut 2010*) utilisés chez des nouveaux nés et en pédiatrie.

COLONNES ADSORPTIVES non spécifiques: polymère de divinylbenzène

9^e JOURNÉES CAPSO

Déterminants pharmacocinétiques de la séquestration dans les ECMO

Sites possibles de fixation: tubing PVC, échangeur gazeux, corps de pompe. Problème: site de prélèvements est post-filtre uniquement.

Table 1. Expected Drug Sequestration Based on Medication PK Characteristics.

High Degree of Drug Sequestration	Low Suspicion for Drug Sequestration
Lipophilic	Hydrophilic
Highly protein bound	Low amount of protein binding
Large molecular size	Smaller molecular size
Ionized/charged molecules	Uncharged molecule

LogP and Protein Binding Characterization

LogP	High Protein Binding %	Low Protein Binding %
Lipophilic LogP	≥1	≥50%
Hydrophilic LogP	<1	<50%

Information adapted from: Ha et al. [2]. *Johns. ECMO & Drugs. 2024*

Mais controverse sur la validité prédictive de ces déterminants:
Zhang (2021) ne rapporte pas de corrélation entre les taux de séquestration et ces paramètres
Heith (2019) rapporte 2 médicaments (mofetil et tacrolimus à forte lipophilie et PB et absence de séquestration

9^e JOURNÉES CAPSO

Regression linéaire logP = f(Protein binding%) – 47 médicaments utilisés en réanimation

logP = f(PB) XY

9^e JOURNÉES CAPSO

Médicaments et ECMO – Conséquences thérapeutiques

En raison de la durée des ECMO qui dépassent très souvent 72h pouvant atteindre 30 jours avec le même filtre, les ECMO exposent à un double risque:

Précoce : séquestration → baisse voire perte d'efficacité
Tardive: saturation et/ou relargage → surdosage et toxicité

Voriconazole: *Sriet et al. JAC 2009*

Caspofungine, fluconazole et voriconazole : *Baud et al SFAR 2025*

Les taux de séquestration de la caspofungine, du fluconazole et du voriconazole sont de 18.9, 9.7 et 15.8 % des doses initiales.

Le washout a éliminé 2.0, 3.2 et 6.5 % des doses initiales de caspofungine, de fluconazole et de voriconazole, respectivement.

Par conséquent, les quantités non libérables de caspofungine, de fluconazole et de voriconazole, séquestrées dans les circuits HLS ont été 16.9, 6.5 et 9.3 % des doses initiales, respectivement.

Conséquences thérapeutiques

Nécessité de faire des modèles in vitro pas seulement sur 24 h mais aussi sur 7 voire 14 jours

9^e JOURNÉES C/PSO

Plan

- I. Classification des DM-CEC
- II. Rappel de pharmacocinétique in vitro et conséquences sur les méthodes
- III. Déterminants de la séquestration CKRT & ECMO. Conséquences thérapeutiques
- IV. Résultats acquis. Conséquences thérapeutiques
- V. Perspectives
- VI. Conclusions

9^e JOURNÉES C/PSO

Taux de séquestration de médicaments dans les circuits ECMO adultes et pédiatriques

Elevé: ≥ 50%	Modéré: 20-49%	Faible: 0-19%	
Ampicilline	Caspofungin	Cefotaxime	
Dexaméthosone	Cefazoline	Ciprofloxacine	
Fentanyl	Cefopérazone	Cyclosporine	
Héparin	Ceftriaxone	Daptomycine	
Meropenem	Fosphenytoin	Epinephrine	
Morphine	Micafungin	Fluconazole	
Paracétamol	Midazolam	Hydromorphone	
Propofol	Polymyxin B	Linezolid	
Sufentanyl	Subactam	Micophenolate mofetil	
Voriconazole	Teicoplanine	Phenobarbital	
	Vancomycine	Tacrolimus	
		Thiopentone	
		Tigecycline	
		Vancomycine	

Références consultées:
Mehta 2007
Wildschut 2010
Shekar 2015
Lemaître 2015
Heith 2019
Zang 2021
Raffaelli 2019

Lorsque plusieurs valeurs de taux de séquestration ont été rapportées la valeur la plus élevée a guidé la classification

9^e JOURNÉES C/PSO

EERC – Publications répondant aux mots-clés: In vitro/médicament/adsorption

Un taux de séquestration a été rapporté pour 35 médicaments essentiellement des anti-infectieux.
Pour 22 médicaments: une seule étude
Pour 7 médicaments: 2
Pour 6 médicaments: 3 et plus

La séquestration est spécifique d'un médicament face à un filtre défini: plusieurs filtres en EERC

Difficulté de présenter un tableau croisé => liste des publications: DCI-1^{er} Auteur-Année

9^e JOURNÉES C/PSO

EERC – Publications répondant aux mots-clés: In vitro/médicament/adsorption

Comment interpréter un taux de séquestration?

1. Regarder si le milieu est d'une part du **sang reconstitué/dilué** ou **saline albumine/plasma** ou **crystalloïde sans protéine**
2. Rechercher le taux de séquestration expression des résultats mg et %. Interprétable si possible de transformer en % (conversion : mg séquestré/(mg ajouté – mg restant%)
3. Classification de l'ampleur de la séquestration – **Conséquences thérapeutiques**

9^e JOURNÉES C/PSO

EERC – Conséquences thérapeutiques de l'ampleur de la séquestration

0 - ≤19% Un taux d'élimination par un organe inférieur à 20% signifie une contribution non significative à l'élimination d'un médicament (Derendorf & Schmidt). **Donc pas de nécessité d'adaptation. Vrai: si un seul DM-CEC**

20 - 49% : i) Augmentation temporaire des doses, ii) Attention à l'effet d'un changement de filtre, iii) Chez l'adulte augmenter la dose de dialfiltration durant l'administration du médicament, iv) voie de recherche: Présaturation du filtre (amikacine, *Houzé et al UAO 2025*), v) JTDMM +++

≥ 50%: Gentamicine-ST, Rifampicine-AV, Caspofungin-ST, Micafungin-AV: faible probabilité d'effet thérapeutique d'une augmentation de dose. Trouver une alternative thérapeutique.
Caspofungine et ST: 6 cas de preuve microbio d'inefficacité dont 5 avec décès (ANSM)

9^e JOURNÉES C/PSO

Références bibliographiques (1/3)

1. Amikacin (Kronfol, 1987; Tian, 2008; Tian, 2011)(Frédéric J. Baud et al. 2021; F. J. Baud, Houze, et al. 2020)
2. Anidulafungin (Kolbinger, 2018)
3. Apixaban (Andrews, 2021)
4. Caspofungin (Purohit, 2019) (F. J. Baud, Jullien, et al. 2020; Frédéric J. Baud, Jullien, et al. 2023)
5. Cefepime (Green et al. 2022)
6. Cefotaxime (Le Ven et al. 2023)
7. Ceftolozane (Chajamorn, 2017)
8. Ciprofloxacine (Onichimowski, 2020; Onichimowski, 2021)
9. Clavulanate (Wan, 2019)
10. Dalbavancin (Vilay et al. 2010)
11. Etanercept (Fleming et al. 2009)
12. Fluconazole (Watt et al. 2017; F. J. Baud et al. 2021)

9^e JOURNÉES C/PSO

Références bibliographiques (2/3)

1. Gentamicin (Lam P, 2010; Onichimowski, 2020; Onichimowski, 2021; Tian, 2011)
2. Imipenem (Soo Min Jang et al. 2021)
3. Levofloxacin (Choi, 2004; Tian, 2006)
4. Linezolid (Shiraishi, 2012)
5. Liposomal amphotericin B (Purohit, 2019)
6. Meropenem (Purohit, 2019; Sime, 2018)(Jamal et al. 2015)
7. Micafungin (Watt et al. 2017)(F. J. Baud, Jullien, et al. 2020)
8. Netilmicin (Lam P, 2010)
9. Phenytoin (Kronfol, 1987)
10. Piperacillin (Economou, 2020; Purohit, 2019)(Jamal et al. 2015)
11. Potassium (Houze et al. 2020)
12. Relebactam (Soo Min Jang et al. 2021)
13. Rezafungin (S. M. Jang, Hough, et Mueller 2018)

9^e JOURNÉES C/PSO

Références bibliographiques (3/3)

1. Rifampicin (Roehr, 2015)
2. Tazobactam (Chajamorn, 2017)
3. Tedizolid (Lewis, 2015)
4. Teicoplanin (Shiraishi, 2012) (duplication of the same results in another publication not indexed in PubMed by Menth et al 1992 (Menth, 1992))
5. Theophylline (Kronfol, 1987)
6. Ticarcillin (Economou, 2020) (Wan, 2019)
7. Tigecycline (Onichimowski, 2020; Onichimowski, 2021)
8. Tobramycin (Kronfol, 1987)(Frédéric J. Baud et al. 2021)
9. Vaborbactam (Sime, 2018)
10. Vancomycin (Onichimowski, 2020; Onichimowski, 2021; Tian, 2008; Shiraishi, 2012) (Quale et al. 1992)(Frédéric J. Baud, Houze, et al. 2023) Voriconazole (Purohit, 2019)

9^e JOURNÉES C/PSO

Plan

- I. Classification des DM-CEC
- II. Rappel de pharmacocinétique in vitro et conséquences sur les méthodes
- III. Déterminants de la séquestration CKRT & ECMO. Conséquences thérapeutiques
- IV. Résultats acquis. Conséquences thérapeutiques
- V. Perspectives
- VI. Conclusions

9^e JOURNÉES C/PSO

Perspectives

1. Dans toutes les études, l'exposition du filtre au médicament a été faite en mode bolus:
 - Avantage: le filtre est d'emblée exposé à la concentration maximale
 - Inconvénient: ne reflète pas le mode d'administration IV de nombreux médicaments perfusés sur 30 min, 1 à 2 h voire en continu.

⇒ Il faudrait faire des études en conditions réelles d'utilisation: la séquestration augmente avec la durée de la perfusion.
2. Les études in vitro n'étudient que la séquestration de la 1^{ère} dose.
 - ⇒ Séquestration pour les suivantes sur le même filtre?
3. Il existe en fait 2 types de séquestration:
 - La plus fréquente: concentration indépendante: localisées dans le tubing PVC
 - La plus rare: concentration dépendante: localisée dans le filtre

⇒ Les études de séquestration doivent définir le type de séquestration
4. La séquestration concentration-dépendante dépend du débit d'ultrafiltration => risque particulier en pédiatrie. Modulé par la réduction de surface?

9^e JOURNÉES C/PSO

Plan

- I. Classification des DM-CEC
- II. Rappel de pharmacocinétique in vitro et conséquences sur les méthodes
- III. Déterminants de la séquestration CKRT & ECMO. Conséquences thérapeutiques
- IV. Résultats acquis. Conséquences thérapeutiques
- V. Perspectives
- VI. Conclusions

Article conseillé: Raffaelli et al :

Drug disposition and pharmacotherapy in neonatal ECMO: from fragmented data to integrated knowledge. Frontiers in Pediatrics. 2019. DOI: 103389/fped2019.00360.

9^e JOURNÉES C/PSO

Conclusion: exercice pratique (1/3)

Titre de l'article: « Antifungal Extraction by the Extracorporeal Membrane Oxygenation Circuit »

Watt et coll 2017

Composition chimique des constituants d'une ECMO associée à une CKRT

Component	Manufacturer	Model	Material
Oxygenator	Maquet	Adult/Pediatric Quadrox ID*	Polymethylpentane hollow fibers with Biolinet coating
Hemofilter	Sorin	DHF0.2	Polyethersulfone
Pump	Sorin	Revolution Centrifugal	Polycarbonate
Tubing	Sorin	Smart Tubing	Phosphorylcholine coated polyvinylchloride
Cannula	Medtronic	10 ft Biomedicus Arterial Cannula	Carmeda\$ coated polyurethane

9^e JOURNÉES CAPSO

Conclusion: exercice pratique (2/3)

Kevin M. Watt, et al

Antifungal Extraction by the ECMO Circuit
J Extra Corpor Technol. 2017;49:150-159

Données: une séquestration importante de la micafungine est observée dans le montage A mais ni dans B, ni dans C. Le fluconazole n'est séquestré dans aucun montage

Question: où a lieu la séquestration de la micafungine?


A Complete Circuit



B Oxygenator Circuit



C Pump Circuit



9^e JOURNÉES CAPSO

Conclusion: exercice pratique (3/3)

Kevin M. Watt, et al J Extra Corpor Technol. 2017;49:150-159

« Antifungal Extraction by the ECMO Circuit »

Données: une séquestration importante de la micafungine est observée dans le montage A, mais ni dans B, ni dans C. Le fluconazole n'est séquestré dans aucun montage

Question: où a lieu la séquestration de la micafungine? Dans l'hémofiltre et pas le circuit d'ECMO

Discussion:

Dans 60% des ECMO, une EERC est associée à l'ECMO. Dans les rapports de cas cliniques de séquestration, il faut impérativement préciser l'existence ou non d'une EERC

Le titre de l'article est erroné car il laisse penser que la séquestration a lieu dans le circuit d'ECMO alors que les auteurs démontrent qu'elle survient dans le circuit de l'EERC.


A Complete Circuit



B Oxygenator Circuit



C Pump Circuit



9^e JOURNÉES CAPSO