TIH et chirurgie cardiaque

Victor-Emmanuel BRETT
victor.brett@chu-bordeaux.fr
Laboratoire d'hématologie

Physiopathologie de la Thrombopénie Induite par l'héparine (TIH)

La **TIH** :

Thrombopénie médicamenteuse atypique

1. Survient dans la plupart des cas après 5 à 10 jours de traitement par l'héparine
2. Réaction immune : anticorps dirigés contre une protéine de soi, le facteur plaquettaire 4 (PF4)
3. Saignements rares et complications thrombotiques paradoxales fréquentes

La réaction immune en présence d'héparine

Auto (néo)-antigène :

Tétramère de PF4 après complexation à l'héparine PF4/h ou à un GAG PF4P (polyanions)

Les complexes HFP4 se forment à des rapports stœchiométriques bien définis

Ratio PF4/héparine optimal pour le rôle pathologique

- Affinité liaison PF4/h dépendante : degré de sulfatation (DS) du polyanion et longueur de la chaîne

- HNF > HBPM > Pentasaccharide (1700 D)

- ULC : rôle immunogène et une affinité majorée pour les AC de la TIH

Amiel J, JTH 2002
Revue N Blood 2005

GAGS	Dégré de sulfatation
Ac. Hyaluronique	0,5
Chondroïtine Sulfate	0,5-0,7
Chondroïtine Sulfate 6-S-C	0,8
Dermatan Sulfate	1,4
Pentasaccharide	1,8
Héparine Sulfate	2,0-2,4
HNF	2-2,5
HBPM	2-2,5
ULC	2-2,5

GARCIA B. Sulfate Polyanions as Modulators in Thrombotic Thrombocytopenic Syndrome. Front Molecular Biol 2012

La TIH, une réaction immune atypique

Qu'observe-t-on ?

- IgG précoces J4 sans IgM, pas de switch isotypique
- IgG transitoires <3 - 4 mois
Warkentin N Engl J Med 2001,344:1286

- Séroconversions sous héparine sans TIH : chirurgie cardiaque (30-60%), autres chirurgies (8 à 17 %)

Profil atypiques

- Delayed-onset HIT : TIH retardée J30 après arrêt héparine
- Spontaneous HIT : AC sans exposition à hep

Comment l'expliquer ?

Un changement conformationnel du PF4

- Fréquence AC antiPF4h dans la parodontite (Lipopolysaccharides lipidés et acides teichoïques = Complexe lipoteichoïques)
- Greinacher A Blood 2011
- Pré immunisation : sepsis (Krauel K Blood 2011-Krauel K Blood 2012)
- Chondroïtine hypersulfatée (héparine contaminée)
- ADN : le PF4 peut se lier aux acides nucléiques Jaax ME Blood 2013
- AC anti PF4/GAGS

- Auto Immune HIT (aHIT) : AC anti PF4, PF4/P ou H, forces de liaisons conditionnant la pathogénicité avec ou sans héparine
Nguyen, TH et al. Nat Commun 2017

Un état d'hyper-coagulation cellulaire multifactoriel

Pouillard C Blood 2011
Adapté de Cheng BH. Evolving concepts of pathogenesis of heparin-induced thrombocytopenia and therapeutic implications. Int J Lab Hemost 2009

Développement des anticorps anti PF4-héparine après une CEC

27-50% des patients après une CEC développent des anticorps anti PF4-h détectables

→ seuls 2% d'entre eux développeront une TIH

A.K. Schäfer et al. / European Journal of Cardio-Thoracic Surgery

Score de probabilité prétest clinique « 4T »

Thrombopénie : NP + non-accident plaquettaire	Diminution NP > 50% ET non > 20 G/L ET pas de chérogène dans les 31 précédents	2
	Diminution NP > 50 % MAS absente dans les 31 précédents	1
	neutre de 40-50 % de NP de 30 à 50 % au basit entre 30 et 18 G/L	0
	Diminution de NP < 20%	0
Décal de survenue de la thrombopénie (Temps?)	Entre 3 à 30 jours après début héparine ou 1 à 11 jours héparine c/ 301	2
	Diminution NP > 50 % MAS absente dans les 31 précédents	1
	neutre de 40-50 % de NP de 30 à 50 % au basit entre 30 et 18 G/L	0
	< 3 jours exposition à l'héparine plus ancienne (plus de 300)	0
Thrombose	Nouvelle thrombose veineuse ou artérielle confirmée ou médicamenteuse ou réaction systémique après héparine IV	2
	Extension d'une thrombose préexistante ou récurrente sous traitement anticoagulant	1
	ne nouvelle de thrombose non confirmée	0
	ou artérielle veineuse non héparinique après héparine IV/SC	0
	ou thrombose d'un membre	0
	Aucun événement	0
Autre cause possible de thrombopénie	Aucune autre cause de thrombopénie	2
	Autre cause possible	1
	Autre cause certaine de thrombopénie	0

* 1 ou 2* pour exposition à l'héparine
 * 0 ou 1* pour exposition à l'héparine
 * 0 ou 1* pour exposition à l'héparine
 * 0 ou 1* pour exposition à l'héparine

Probabilité de TIH
 • Forte 6-8 points
 • Modérée 4-5 points
 • Faible 0-3 points

TIH et Thromboses Veineuses

Maladie thromboembolique et TIH : jusqu'à 50% des événements sont veineux

Évènement de novo ou récurrence ± extension d'une thrombose préexistante
 Embolie pulmonaire fréquente

Quelques particularités ...

- Parfois, la thrombose précède la thrombopénie
- Thromboses veineuses cérébrales possibles
- Thromboses veineuses des membres supérieurs (sur cathéter +++)
- Gangrène veineuse des membres inférieurs

TIH et Thromboses artérielles

Plus rares que les thromboses veineuses

Peuvent concerner tous les troncs artériels :

- Aorte et branches → ischémie aiguë des membres inférieurs
- Artères cérébrales → accident vasculaire cérébral
- Coronaires → infarctus du myocarde

Particularités des thromboses :

- **Anatomo-pathologiques** : atteinte des gros vaisseaux (aorte ++)
- **Anatomopathologiques** : « caillot blanc » (leucocytes, plaquettes++)

TIH : les thromboses sont parfois « retardées »

Delayed-Onset Heparin-Induced Thrombocytopenia and Thrombosis 2001

Theodore E. Warkentin, MD, and John G. Kelton, MD

12 cas de TIH « retardées » dont 6 survenues après la sortie du malade de l'hôpital.
 Titres élevés d'anticorps et activation plaquettaire héparine-indépendante

Delayed-Onset Heparin-Induced Thrombocytopenia 2002

Lawrence M. Bier, MD; Walid K. Attaha, MD; Abner Straker, MS, RN; and John L. Francis, PhD

14 cas de TIH « retardées » et sévères (thromboses ++), avec une diminution modérée des plaquettes, mais aggravée ++ sous héparine

En pratique : toujours y penser si thromboses chez un malade récemment hospitalisé et traité par héparine, a fortiori si plaquettes < 150 G/L

TIH et manifestations cliniques atypiques

- **Lésions cutanées**
 Plaques érythémateuses
 Nécroses cutanées
- Amnésie transitoire
- Douleurs abdominales et des membres inférieurs
- Frissons, dyspnée après bolus d' héparine
- **Insuffisance surrénale aiguë** : infarctus hémorragique de surrénales

Le cas particulier du post-op de chirurgie cardiaque

Score 4T moins fiable : profil de la cinétique plaquettaire **primordiale** +++
 Profil A : courbe biphasique
 Profil B : monophasique, non remontée des plaquettes

Variables	Score
Platelet count time course	2
Pattern A	1
Pattern B	0
Time from CPB to index date	2
> 5 days	2
< 5 days	0
CPB duration	1
< 118 min	1
> 118 min	0
Total score	2
Classification	
High probability of HIT	≥ 2
Low probability of HIT	< 2
VPN 97% (28/29)	
VPP 62% (34/55)

Score de Lillo-Le Louët JTH 2012

DIAGNOSTIC d'une TIH

SUSPICION CLINIQUE

- Diminution de la numération plaquettaire +/- Thromboses, CIVD, nécrose cutanée ...

ET CONFIRMATION BIOLOGIQUE

- Détection d'anticorps anti-PF4 capables d'activer les plaquettes

2 Buts:

- Identifier les VRAIES TIH
- Eviter les faux diagnostics de TIH

Rechercher la présence des anticorps anti-PF4/H

↳ **Tests immunologiques**

Rechercher la pathogénicité des anticorps anti-PF4/H

↳ **Tests fonctionnels**

Les tests immunologiques

STIC (Stago®)

Rapide qualitatif

Accustar

Rapide semi quantitatif

Tests ELISA

Semi quantitatif

Les tests fonctionnels

D'après C. Pouplard

La TIH reste un évènement rare

ORIGINAL ARTICLE

Heparin-induced thrombocytopenia diagnostic testing after adult cardiac surgery: a single-centre experience and development

Anne-Kristin Schaefer¹, Bastien Dorban², Ines Knecht³, Lisa Fander⁴, Caroline Holubek⁵, Tamara Braunschweig⁶, Mohamed Moustafa⁷, Simon Perrot⁸, Martin Deuschel⁹ and Barbara Knöcher¹⁰*

Key finding(s)

TIH incidence was 0.8%, which is slightly lower than that described before, and was not influenced by patient age or gender.

Prevalence and outcome of heparin-induced thrombocytopenia diagnosed under veno-arterial extracorporeal membrane oxygenation: a retrospective nationwide study

Conclusion: Prevalence of HIT among patients under VA-ECMO is extremely low at 0.36% with an associated mortality rate of 33.3%, which appears to be in the same range as that observed in patients treated with VA-ECMO without HIT. In addition, HIT was associated with a higher rate of mortality with clinical suspicion of HIT and positive anti-PF4/heparin antibodies.

Intensive Care Med 44, 2460-2468 (2018).

Au CHU de Bordeaux (2023) :

incidence TIH : 0.99 %

Activité 1301 CEC adulte

How I Diagnose and Manage HIT

(Theodore E. Warkentin 2008)

EIA-IgG/AM result (OD units): ≤ 0.4 0.4-1.0 1.0-1.5 1.5-2.0 >2.0

Probability of GRA+ status: ~0% ~5% ~25% ~50% ~90%

High ODs in the EIA increase the probability of GRA+ for HIT cases.

Figure 1. "Iceberg model" of HIT. Clinical HIT, comprising HIT with

En post CEC, bien sélectionner les patients suspects de TIH.

Arguments forts :
cinétique plaquettes, HNF, thrombose, exclusion autres causes

- Probabilité score et cinétique +++
- Test rapide qualitatif si score > 3 => Bonne VPN, mauvaise VPP
- Test ELISA quantitatif IgG (OD) Excellente VPN, mauvaise VPP. OD > 1 [Z] VPP
- TEST Fonctionnel D'ACTIVATION PLAQUETTAIRE spécificité +++

2 molécules ont l'AMM en France pour le traitement de la TIH

	Danaparoiide sodique (ORGARAND)	Argatroban (ARGANOVAS)
Origine	Mélange de GAG (dermatane, héparane et chondroïtine sulfate)	Produit de synthèse à partir de la L-Arginine
Action	Indirecte, dépendant de l'antithrombine - anti-Xa et anti-thrombine	Anti-thrombine direct. Se lie à la thrombine libre et liée
Élimination	rénale	hépatique
1/2 vie	25 h = activité anti-Xa 7 h = activité anti-IIa	40-50 mn
Surveillance biologique	cible CHU Bdx Activité anti-Xa Préventif < 0,40 Curatif 0,5-0,7 UI/ml	Activité anti IIa (cible CHU Bdx) 0,5 à 1,2 préventif 1,2 à 2 µg/ml curatif (TCA 2,5-3)
Inconvénients	1/2 vie longue (majorée si IR)	Rapidement réversible Durée de vie courte sauf interactions IV strict Allonge TQ +++, interfère avec INR (relais NIX délicat), F2 FS ininterprétables
Avantages	Surveillance biologique simple	

Prise en charge : arrêt Héparine → substitution

Choix produit/pesologie

- Fonction rénale et hépatique
 - Risque hémorragique : chirurgical précoce versus médical
 - Présence ou non d'une thrombose
 - FR sous jacents en l'absence de thrombose objectives : FA, MTEV, ...
- Le passage d'un produit à l'autre en cours d'hospitalisation est possible

Surveillance/adaptation :

ED si TIH confirmé,
Suivi
activité anti IIa Argatroban +/- rTCA

activité anti-Xa Danaparoiide

Cibles locales :

Danaparoiide SC ou IV :

- Curatif : 0,5-0,7 UI/ml. Ne pas dépasser 0,8 : risque hémorragique
- Préventif : 0,2-0,4 UI/ml. Le suivi est réalisé par l'activité anti Xa Organan

ARGATROBAN : quelles cibles pour le suivi ?

- Pas d'essais cliniques sur l'Argatroban déterminant précisément des zones thérapeutiques de l'activité anti-IIa.
- La plupart des publications rapportent des surveillances avec le ratio du TCA ou le temps : ratio 1,5-3 ou TCA < 90s ou TCA entre 50-80 sec.
- A ce jour, recommandations GHIP GFHT
-rTCA 1,5-3 (sans dépasser 100s)
-Activité anti IIa ARG : 0,5-1,5 µg/ml

Seuil local :

- rTCA entre 1,5-2,5
- Activité anti IIa : 0,5-2 µg/ml (0,5-1,2 zone basse/préventive et 1,2-2 zone haute/curative)

Numéro de surveillance de l'activité anti-IIa Argatroban (ratio)	Moins de 1,5	Entre 1,5 et 2,5	Plus de 2,5	Situation clinique
Patient 1	0,64	0,34		Post opératoire de CC, pas de thrombose
Patient 2	0,8	0,22		Post op de CVC, pas de thrombose
Patient 3	0,95	0,33		Polytraumatisme thrombose
Patient 4	1,3	0,42		Rés médicale EP + thrombose de filre
Patient 5	1,84	1,38		Rés COVID EP
Patient 6	2,2	0,4		Mélange thrombose + curatif (EP thrombose arrêt et rétro-kinolase)

Corrélation entre l'activité anti-IIa Arganova et le TCA

- Suivi avec l'activité anti-IIa Arganova préférable
- Si suivi sur le TCA : tenir compte de la sensibilité du réactif.

Durée de l'anticoagulation post TIH

TIH isolée avec ou sans thrombose	TIH avec thrombose	TIH isolée sans thrombose (après exclusion EDM/ED CVC)
II indication d'anticoagulation au long cours	caractère précoce, à bien documenter ; exclusion cancer...	Et pas d'indication à être anticoagulé
Long cours	3 mois	??

*chercher la thrombose
Après écho-doppler entre 12 et 44 % de thromboses

Recommandation 1A
In patients with acute isolated HIT and no asymptomatic DVT identified by venous compression ultrasonography, the ASH guideline panel suggests that anticoagulation be continued, at a minimum, until platelet count recovery is clearly evident (strong recommendation). The ASH guideline panel suggests against continuing treatment with argatroban if the patient has persisting HIT without platelet count recovery (conditional recommendation, very low certainty in the evidence) (30)(2).

-Crétique de remonte des Plaquettes et > 150 G/L
- Traitement probablement au moins 3 mois (risque résiduel/durée surveillance études)

ASH Guidelines 2018

Chirurgie cardiaque sous CEC et TH

* La stratégie thérapeutique choisie, notamment si décide d'utiliser l'héparine pour la CEC, devra tenir compte du site d'anticoagulation anti-F1a1/mesure chez le patient avec un test immunologique quantitatif spécifique et sensible.

Figure 4 - Stratégies thérapeutiques pour une chirurgie cardiaque en cas de TH

	Guidelines ACCP 2012 (4) 1 ^{er} choice	ACCP 2012 (4) 2 nd choice	Guidelines ASH 2018 (1)	Expert opinion GHP/GHT 2019 (5)
Acute HIT (thrombocytopenia, anti-PF4/IIa antibodies with aggregative capacity)	Bivalirudin	HEPARDI with antiplatelet agent	Bivalirudin or PLEX or HEPARDI with antiplatelet agent	Bivalirudin or argatroban or heparin with antiplatelet agent (trofiban or cangrelor)
Subacute HIT type A (no thrombocytopenia, anti-PF4/IIa antibodies without aggregative capacity)	Bivalirudin	HEPARDI with antiplatelet agent	Bivalirudin or PLEX or heparin with antiplatelet agent	Bivalirudin or argatroban or heparin with antiplatelet agent (trofiban or cangrelor)
Subacute HIT type B (no thrombocytopenia, anti-PF4/IIa antibodies without aggregative capacity)	Bivalirudin	HEPARDI with antiplatelet agent	HEPARDI	The choice will consider the anti-PF4/IIa antibody level
Preacute HIT (no thrombocytopenia, no anti-PF4/IIa antibodies)	HEPARDI	HEPARDI	HEPARDI	HEPARDI

Table 2: Antithrombotic propositions for bypass in cardiac surgery with HIT, adapted from Koster et al. [11]
 ACCP: American College of Chest Physicians, ASH: American Society of Hematology, GHP/GHT: Group of Interest in Perioperative Haemostasis and French Study Group on Haemostasis and Thrombolysis

Stratégie de substitution de l'héparine

L'Argatroban est déconseillé lors de la CEC

Intraoperative Use

Déconseillé
 There are scant data with regard to the use of argatroban during cardiac surgery, particularly when CPB is employed. While several articles described the successful use of argatroban in patients undergoing OPCAB surgery, several publications also report catastrophic bleeding when argatroban was used for anticoagulation during CPB.²² In the largest case series published, argatroban was used in seven HIT patients undergoing left ventricular assist device (LVAD) implantation with antero-venous ECMO support. Major complications ranged from one intraoperative device thrombosis to uncontrolled bleeding in four patients; in one patient it was lethal.²²

Argatroban and Bivalirudin for Perioperative Anticoagulation in Cardiac Surgery

Andrew Koster, MD, David Pearson, MD, PhD, FAHA, Jeroen H. van der Wal, MD, FAHA, FCCM, RCPSC

- Peu de données
- Protocoles multiples
- Evénements mixtes thrombo-embolique (caillottes dans réservoir et l'oxygénateur) et hémorragiques [Revue de Ross et coll \(AFAR 2014, 33: 514\)](#)
- Non cité dans recos internationales

Because of the high rate of reported perioperative bleeding, we advocate against the use of argatroban for anticoagulation during cardiovascular surgery in noncardiac and postoperative settings; the use of argatroban appears to be reasonable

Revelly E. J Clin Med. 2023 Jan 18;12(3):786

La BIVALIRUDINE

Petit peptide inhibiteur direct de la thrombine par liaison sur le site actif et exosite I (site pour AT) le binding entraîne un changement de la protéine et un clivage protéolytique

- Demi-vie courte 20 à 30 minutes.
- Sauf si IR sévère => 3,5 h
- Catabolisée en ses acides aminés par des protéases, notamment la thrombine (80%).
- pas de métabolites actifs.
- 20% de la bivalirudine sont excrétés sous forme inchangée dans les urines.

Seul médicament étudié en essais cliniques prospectifs multicentriques

- EVOLUTION ON (plus de 150 revascularisations myocardiques ou chirurgie valvulaire isolée) sous CEC en dehors de la TH
- CHOOSE ON (Protèbes de valves et/ou revascularisation myocardiques avec TH) (Koster 2018 anesthesiology DT in cardiac surgery).

Les résultats de ces 2 essais et notamment de CHOOSE ON avec des patients à plus haut risque péri-opératoire, montrent un profil de sécurité et d'efficacité même si dans ce dernier essai l'exposition transfusionnelle est significativement augmentée.

Data	All (n = 49)	Renally Impaired (CrCl 30-60 mL/min) (n = 10)
Intraoperative blood loss in mL (mean ± SD [range])	575 ± 524 (50-1,900)	325 ± 150 (200-500)
24-hour blood loss in mL (mean ± SD [range])	998 ± 595 (100-3,200)	1012 ± 630 (370-2,160)
Any transfusion at day 7	41 (83.7%)	10 (100.0%)
Red blood cells	38 (77.4%)	9 (90.0%)
Platelets	17 (34.7%)	4 (40.0%)
Fresh frozen plasma	24 (49.0%)	6 (60.0%)
Red blood cells (mean ± SD [range])	5.6 ± 3.8 (1-16)	5.9 ± 4.6 (1-14)
Platelets (mean ± SD [range])	8.6 ± 7.2 (1-23)	14.2 ± 8.1 (5-25)
Fresh frozen plasma (mean ± SD [range])	6.0 ± 4.7 (1-20)	7.7 ± 6.8 (1-20)

Koster A Anesthesiology, 2018

Protocole CEC/bivalirudine

	Bolus patient (mg/kg)	Perfusion continue (mg/h)	Bolus circuit (mg/kg)	ACT
Avant la CPB	1	2,5	50	>400 s ou au min > 2,5 fois ACT de base.
Pendant la CPB		arrêt 15 min avant le sevrage		Toutes les 15 min Ne pas dépasser 450 s Si < 400 s refaire un bolus de 0,1 à 0,5

Relation entre le temps de coagulation de l'ACT et la concentration de bivalirudine à forte concentration non linéaire

Ivan P. Casserly Thrombosis Research (2004)

Koster A. Ann Thorac Surg, 2007
Koster A Anesthesiology, 2018

C. MULLER

Précautions sont à prendre lors de la procédure de CEC

Pas de stase au niveau des réservoirs notamment en limitant le volume de sang et en le mobilisant (si pas de pompe centrifuge).
→ Aspiration régulière du sang dans le thorax
(Sharma G. J Cardiac Critical Care 2022)

Circuit sans coating par héparine, pas HNF ni dans la poche de purge du cathéter artériel, ni celle du cell saver
Pas d'hémofiltration pendant le bypass

Normothermie

Cas particulier de l'angioplastie coronaire

Proposition # 34
In the case of acute HIT, it is proposed to treat patients requiring transcatheter angioplasty for acute coronary syndrome, preferably with bivalirudin or an analogue, or failing that with argatroban.
(STRONG AGREEMENT)

Recommendation 5.2

In patients with subacute HIT B or remote HIT who require PCI, the ASH guideline panel suggests treatment with bivalirudin rather than UFH (conditional recommendation, very low certainty in the evidence □□□□).

Remarks: Heparin is an acceptable alternative for patients with subacute HIT B or remote HIT if a suitable non-heparin anticoagulant is not available or clinician experience is lacking. If heparin is used, exposure should be limited to the intraprocedural setting and should be avoided before and after the procedure.

If bivalirudin is not available or if there is a lack of institutional experience, argatroban might be a suitable substitute. Choice of drug may be influenced by drug availability, cost, ability to monitor the anticoagulant effect, and clinician experience.

Protocoles disponibles:

-bivalirudine: bolus 0,75 mg/kg

puis perfusion IV 1,75 mg/kg/heure

Lewis Catheter Cardiovasc Interv 2002, 57: 177

-argatroban: bolus 350 µg/kg

puis perfusion IV 25 µg/kg/minute

Mahaffey I Intensive Cardiol 2003, 15: 611

Stratégie d'administration simultanée d'héparine et d'antiagrégant plaquettaire par voie parentérale

Le Tirofiban (Agrastat®)

T_{1/2} : 1,5 à 2 h

Élimination rénale +++

Empêche la liaison du fibrinogène au récepteur GpIIb/IIIa.

Le degré de cette inhibition évolue en parallèle à la concentration plasmatique du tirofiban. La fonction plaquettaire revient à son niveau initial dans les 6 à 8 h après l'arrêt. En cas de surdosage, la transfusion plaquettaire est inefficace.

	Bolus patient (µg/kg)	Perfusion continue (mg/kg/min)	ACT
CPB 5 à 10 min avant héparine	10	0,15	Héparine protocole habituel

Pas de suivi biologique.

Timing de l'arrêt ?

Limitations : complications hémorragiques, produit dangereux en cas d'IR sévère.

Très peu de littérature et ancienne ++

Koster A. One-year experience with the platelet glycoprotein IIb/IIIa antagonist tirofiban and heparin during cardiopulmonary bypass in patients with heparin-induced thrombocytopenia type II. J Thorac Cardiovasc Surg 2001

Cangrelor (Kengrexal®)

Analogue synthétique de l'ATP. Inhibiteur parentéral (voie IV) du récepteur P2Y₁₂

Effet ON (2 min)/OFF (4 à 6 min).

Élimination indépendante du rein et du foie.

Pas de prodrogue, pas de transformation hépatique

Pharmacocinétique non affectée par sexe, âge, rein, foie

Protocole Cangrelor

	Bolus IV patient (µg/kg)	Perfusion continue (µg/kg/min)	ACT
Avant la CPB avant l'héparine dose standard	30	4	Monitoring de l'héparine habituel Arrêt 10 minutes avant la prothrombine standard

Monitoring possible par WASP (seuil efficace compris entre 20-50% d'activité plaquettaire) (ou VeriLyNow cartouche P2Y₁₂ (PRU) avant et après cangrelor, seuil PRU < 190 ?)
Girgis et al.

Après arrêt, les fonctions plaquettaires se normalisent dans l'heure.
Critiques sur l'utilisation du cangrelor Revellly E J Clin Med. 2023

Koster A. Res Pract Thromb Haemost 2020. Girgis AM. A A Pract 2019

Cangrelor for cardiopulmonary bypass in patients with heparin-induced thrombocytopenia: it is not so easy

Godier, Amies, Boucebo, Karim-John, Delhay, Nathalie, Gendron, Nicolas, Achouf, Paul, Hamada, Sophie Rym

Patiente de 70 ans → chirurgie → HBPM → EP → TIH → thrombectomie CEC → cangrelor: 30 µg/kg IVD + 4 µg/kg/min IVSE → 1 cangrelor protamine → argatroban

plaquettes 225 x10⁹/L plaq: 22 x10⁹/L
 score 4T : 7 anti-PF4 OD 3,2
 SRA+

- Dose de cangrelor ? Adaptée des recommandations de cardiologie interventionnelle mais appropriées à l'activation plaquettaire des TIH ?
- Demi-vie courte : quid de la stase dans le Cell saver ?
- Citrate dans le Cell Saver ?
- Rebond héparinique post CEC ?
- Pertinence et risque thrombotique des transfusions plaquettaires ?

Immunoglobulines

Mécanisme proposé: inhibition compétitive des anticorps anti PF4/héparine par les IgIV sur les récepteurs Fc plaquettaires et leucocytaires

Persistance de la positivité des tests immunologiques et fonctionnels

Dose : 1g/kg/ 2 jours consécutifs
 +/- associations avec échanges plasmatiques et/ou cangrelor

! Risque thrombotique des IgIV

Warkentin. EXPERT REVIEW OF HEMATOLOGY 2019
 Onuora C. Transfusion 2020

Echanges plasmatiques

Les EP ont montré leur capacité à séronégativer partiellement ou complètement les anticorps anti-PF4/h.

Les protocoles d'échanges décrits dans la littérature sont différents en termes de délai par rapport à la chirurgie et de volume échangé

- **Pré opératoire** : 11 patients avec TIH aiguë ou antécédents de TIH et anti-F4P/h positif a montré que la réalisation d'un seul EP pré opératoire permet de réduire le taux d'anti-F4P/h de 50 à 84 %. Six patients ont même éliminé complètement leur taux d'anticorps après l'échange. Aucune complication liée aux EP ou à la TIH n'a été observé.
- **Péri opératoire** : 24 patients, diminution de 35 à 85 % du taux d'anticorps avec disparition totale de l'anticorps chez 7 patients. Les suites opératoires ont été marquées dans cette seconde étude par 3 décès mais aucun n'a été relié à la TIH. 3 événements thromboemboliques post op. 2 de ses événements pourraient être reliés à la TIH.

Welsby J. Anesth Analg 2010.
 Moreno-Duarte I. Vox Sang. févr 2021
 Koster A. Cardiothorac Vasc Anesth. juin 2021.

ALTHE-PRO (ALternatives Héparine seule – procédures)

Alternatives au traitement anticoagulant conventionnel en situation de contre-indication à l'Héparine seule lors d'une chirurgie cardiaque ou vasculaire, d'une implantation percutanée de valve cardiaque, d'une procédure endovasculaire ou neuro-vasculaire ou d'une ablation de FA. (Promoteur CHU de Lille)

L'objectif principal de l'étude est de **colliger les dossiers cliniques** de recours à une alternative au traitement anticoagulant par héparine seule suite à une TIH

Lors d'une chirurgie cardiaque ou vasculaire, d'une implantation percutanée de valve cardiaque, d'une procédure endovasculaire ou neuro-vasculaire ou d'une ablation de FA.

Tous les évènements hémorragiques et thrombotiques en lien avec la chirurgie sont recueillis.

Merci de votre attention